**MC 1 - 2019**

**Elenco florístico da vegetação ripícola**

| Binómio | Taxon | Família | Tipo fisionómico | Distribuição classe | Floração |
|---|---|---|---|---|---|
| *Adenocarpus complicatus* | Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay | Fabaceae | Nanofanerófito | Submediterrânico | V-VIII |
| *Adiantum capillus-veneris* | Adiantum capillus-veneris L. | Pteridaceae | Geófito | Cosmopolita | I-XII |
| *Aegilops triuncialis* | Aegilops triuncialis L. | Poaceae | Terófito | Subcosmopolita | V-VI |
| *Agrimonia eupatoria* | Agrimonia eupatoria L. | Rosaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | V-VII |
| *Agrostis castellana* | Agrostis castellana Boiss. & Reut. | Poaceae | Hemicriptófito | Cosmopolita | VI-VIII |
| *Agrostis stolonifera* | Agrostis stolonifera L. | Poaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | V-IX |
| *Alisma plantago-aquatica* | Alisma plantago-aquatica L. | Alismataceae | Helófito | W Euroasiático | V-IX |
| *Alliaria petiolata* | Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande | Brassicaceae | Hemicriptófito | Cosmopolita | IV-VII |
| *Allium pallens* | Allium pallens L. | Liliaceae | Geófito | Mediterrânico | V-VIII |
| *Allium paniculatum* | Allium paniculatum L. | Liliaceae | Geófito | SW Euroasiático | V-VIII |
| *Alnus glutinosa* | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Betulaceae | Mesofanerófito | Euroasiático | II-III |
| *Amaranthus albus* | Amaranthus albus L. | Chenopodiaceae | Terófito | Exótico | VI-X |
| *Amaranthus hybridus* | Amaranthus hybridus L. | Chenopodiaceae | Terófito | Exótico | VIII-X |
| *Anagallis arvensis* | Anagallis arvensis L. | Primulaceae | Terófito | Subcosmopolita | II-X |
| *Andryala integrifolia* | Andryala integrifolia L. | Asteraceae | Hemicriptófito | Submediterrânico | VI-VIII |
| *Andryala laxiflora* | Andryala laxiflora DC. | Asteraceae | Terófito | Endémico | VI-VII |
| *Anogramma leptophylla* | Anogramma leptophylla (L.) Link | Hemionitidaceae | Terófito | Cosmopolita | II-IX |
| *Anthriscus caucalis* | Anthriscus caucalis M. Bieb. | Apiaceae | Terófito | Cosmopolita | IV-VI |
| *Aphanes australis* | Aphanes australis Rydb. | Rosaceae | Terófito | Atlântico | II-VIII |
| *Apium nodiflorum* | Apium nodiflorum (L.) Lag. | Apiaceae | Helófito | Euroasiático | V-X |
| *Arabidopsis thaliana* | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | Brassicaceae | Terófito | Subcosmopolita | II-VI |
| *Arenaria leptoclados* | Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. | Caryophyllaceae | Terófito | SW Euroasiático | III-VII |
| *Arisarum simorrhinum* | Arisarum simorrhinum Targ. Tozz. | Araceae | Geófito | Subendémico | I-IV_IX-XII |
| *Aristolochia paucinervis* | Aristolochia paucinervis Pomel | Aristolochiaceae | Geófito | Mediterrânico | II-VI |
| *Aristolochia pistolochia* | Aristolochia pistolochia L. | Aristolochiaceae | Geófito | Endémico | IV-VII |
| *Arrhenatherum album* | Arrhenatherum album (Vahl) Clayton | Poaceae | Hemicriptófito | Endémico | V-VI |
| *Arrhenatherum baeticum* | Arrhenatherum elatius (L.) J.Presl & C.Presl subsp. baeticum Romero Zarco | Poaceae | Hemicriptófito | Mediterrânico | V-VII |
| *Arrhenatherum bulbosum* | Arrhenatherum elatius subps. bulbosum (Willd.) Schebl. & G.Martens | Poaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | V-VII |
| *Arum italicum* | Arum italicum Mill. subsp. italicum | Araceae | Geófito | W Euroasiático | III-VI |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Arundo donax* | Arundo donax L. | Poaceae | Microfanerófito | Mediterrânico | VIII - X |
| *Asparagus acutifolius* | Asparagus acutifolius L. | Liliaceae | Nanofanerófito | SW Euroasiático | IV-IX |
| *Asphodelus serotinus* | Asphodelus serotinus Wolley-Dod | Liliaceae | Geófito | Endémico | III-VI |
| *Asplenium billotii* | Asplenium billotii F.W.Schultz | Aspleniaceae | Geófito | Atlântico | I-XII |
| *Asplenium onopteris* | Asplenium onopteris L. | Aspleniaceae | Geófito | SW Euroasiático | I-XII |
| *Asplenium trichomanes* | Asplenium trichomanes L. | Aspleniaceae | Geófito | Subcosmopolita | I-XII |
| *Athyrium filix-femina* | Athyrium filix-femina (L.) Roth | Athyriaceae | Geófito | Cosmopolita | VI-IX |
| *Atriplex prostrata* | Atriplex prostrata Boucher ex DC. | Chenopodiaceae | Terófito | Subcosmopolita | VII-IX |
| *Avena lusitanica* | Avena barbata subsp. lusitanica (Tab.Morais) Romero Zarco | Poaceae | Terófito | Submediterrânico | IV-VIII |
| *Avena macrantha* | Avena sativa L. subsp. macrantha (Hack.) Rocha Afonso | Poaceae | Terófito | W Euroasiático | V-VII |
| *Avena strigosa* | Avena strigosa Schreb. | Poaceae | Terófito | W Euroasiático | III-VI |
| *Ballota nigra* | Ballota nigra L. | Lamiaceae | Hemicriptófito | SW Euroasiático | V-XI |
| *Barbarea vulgaris* | Barbarea vulgaris R. Br. | Brassicaceae | Hemicriptófito | Cosmopolita | IV-VII |
| *Bartsia trixago* | Bartsia trixago L. | Scrophulariaceae | Terófito | SW Euroasiático | IV-VII |
| *Bellis perennis* | Bellis perennis L. | Asteraceae | Hemicriptófito | SW Euroasiático | I-IX |
| *Bidens frondosa* | Bidens frondosa L. | Asteraceae | Terófito | Exótico | VII - IX |
| *Bituminaria bituminosa* | Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. | Fabaceae | Hemicriptófito | Submediterrânico | IV-VIII |
| *Brachypodium pinnatum* | Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. | Poaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | VI-VIII |
| *Brachypodium sylvaticum* | Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. | Poaceae | Hemicriptófito | Euroasiático | IV-VI |
| *Brassica barrelieri* | Brassica barrelieri (L.) Janka | Brassicaceae | Terófito | Endémico | V-VIII |
| *Briza maxima* | Briza maxima L. | Poaceae | Terófito | Mediterrânico | IV-VI |
| *Briza minor* | Briza minor L. | Poaceae | Terófito | SW Euroasiático | III-VI |
| *Bromus diandrus* | Bromus diandrus Roth | Poaceae | Terófito | Submediterrânico | III-V |
| *Bromus hordeaceus* | Bromus hordeaceus L. | Poaceae | Terófito | W Euroasiático | IV-VII |
| *Bromus sterilis* | Bromus sterilis L. | Poaceae | Terófito | W Euroasiático | IV-VI |
| *Bryonia dioica* | Bryonia dioica Jacq. | Cucurbitaceae | Geófito | SW Euroasiático | IV-IX |
| *Bunias erucago* | Bunias erucago L. | Brassicaceae | Terófito | Submediterrânico | III-VII |
| *Bupleurum gerardi* | Bupleurum gerardi All. | Apiaceae | Terófito | Submediterrânico | V-VIII |
| *Calendula arvensis* | Calendula arvensis L. | Asteraceae | Terófito | Submediterrânico | X-VI |
| *Callitriche brutia* | Callitriche brutia Petagna | Callitrichaceae | Helófito | Atlântico | I-IX |
| *Callitriche stagnalis* | Callitriche stagnalis Scop. | Callitrichaceae | Helófito | Subcosmopolita | III - IX |
| *Calystegia sepium* | Calystegia sepium (L.) R. Br. | Convolvulaceae | Hemicriptófito | Subcosmopolita | IV-IX |
| *Campanula lusitanica* | Campanula lusitanica L. | Campanulaceae | Terófito | Endémico | IV-VIII |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Campanula rapunculus* | Campanula rapunculus L. | Campanulaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | IV-VIII |
| *Cardamine flexuosa* | Cardamine flexuosa With. | Brassicaceae | Hemicriptófito | Euroasiático | IV-VIII |
| *Cardamine hirsuta* | Cardamine hirsuta L. | Brassicaceae | Terófito | Cosmopolita | II-VI |
| *Carduus tenuiflorus* | Carduus tenuiflorus Curtis | Asteraceae | Hemicriptófito | Atlântico | IV-VII |
| *Carex cuprina* | Carex cuprina (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern. | Cyperaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | III-VI |
| *Carex divisa* | Carex divisa Huds. | Cyperaceae | Hemicriptófito | Mediterrânico | III-V |
| *Carex echinata* | Carex echinata J.A. Murray | Cyperaceae | Hemicriptófito | Subcosmopolita | VI-VIII |
| *Carex lusitanica* | Carex paniculata subsp. lusitanica (Schkuhr ex Willd.) Maire | Cyperaceae | Hemicriptófito | Subendémico | III-VII |
| *Carex pairae* | Carex muricata subsp. pairae (F.W. Schultz) Čelak. | Cyperaceae | Hemicriptófito | S Euroasiático | III-VII |
| *Carex pendula* | Carex pendula Huds. | Cyperaceae | Hemicriptófito | Cosmopolita | IV-VI |
| *Carex remota* | Carex remota L. | Cyperaceae | Hemicriptófito | Subcosmopolita | V-VII |
| *Carlina corymbosa* | Carlina corymbosa L. | Asteraceae | Geófito | W Mediterrânico | VII-VIII |
| *Carthamus lanatus* | Carthamus lanatus L. | Asteraceae | Terófito | SW Euroasiático | VI-VIII |
| *Celtis australis* | Celtis australis L. | Ulmaceae | Mesofanerófito | SW Euroasiático | III-IV |
| *Centaurea langeana* | Centaurea aristata subsp. langeana (Willk.) Dostál | Asteraceae | Hemicriptófito | Endémico | III-VI |
| *Centaurium majus* | Centaurium grandiflorum subsp. majus (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante | Gentianaceae | Hemicriptófito | Endémico | V-VII |
| *Cerastium glomeratum* | Cerastium glomeratum Thuill. | Caryophyllaceae | Terófito | Cosmopolita | III-VII |
| *Chaerophyllum temulum* | Chaerophyllum temulum L. | Apiaceae | Hemicriptófito | SW Euroasiático | V-VII |
| *Chamaemelum mixtum* | Chamaemelum mixtum (L.) All. | Asteraceae | Terófito | Submediterrânico | IV-IX |
| *Chelidonium majus* | Chelidonium majus L. | Papaveraceae | Hemicriptófito | Cosmopolita | III-IX |
| *Chenopodium album* | Chenopodium album L. | Chenopodiaceae | Terófito | Subcosmopolita | V-XI |
| *Chenopodium ambrosioides* | Chenopodium ambrosioides L. | Chenopodiaceae | Terófito | Cosmopolita | VIII-XI |
| *Chenopodium polyspermum* | Chenopodium polyspermum L. | Chenopodiaceae | Terófito | Subcosmopolita | VII-X |
| *Chondrilla juncea* | Chondrilla juncea L. | Asteraceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | V-X |
| *Cichorium intybus* | Cichorium intybus L. | Asteraceae | Hemicriptófito | Subcosmopolita | VI - IX |
| *Cirsium arvense* | Cirsium arvense (L.) Scop. | Asteraceae | Geófito | W Euroasiático | VI-VIII |
| *Cirsium vulgare* | Cirsium vulgare (Savi) Ten. | Asteraceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | VI-X |
| *Cistus psilosepalus* | Cistus psilosepalus Sweet | Cistaceae | Caméfito | Endémico | V-IX |
| *Clematis campaniflora* | Clematis campaniflora Brot. | Ranunculaceae | Nanofanerófito | Endémico | VI-IX |
| *Clinopodium vulgare* | Clinopodium vulgare L. | Lamiaceae | Caméfito | SW Euroasiático | V-VIII |
| *Coleostephus myconis* | Coleostephus myconis (L.) Rchb.f. | Asteraceae | Terófito | Submediterrânico | II-VIII |
| *Conium maculatum* | Conium maculatum L. | Apiaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | IV-VIII |
| *Convolvulus arvensis* | Convolvulus arvensis (L.) Roemer & Schultes | Convolvulaceae | Geófito | Cosmopolita | IV-IX |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Conyza albida* | Conyza albida Willd. ex Spreng. | Asteraceae | Hemicriptófito | Exótico | VII-XI |
| *Conyza canadensis* | Conyza canadensis (L.) Cronquist | Asteraceae | Terófito | Exótico | IV-XI |
| *Corrigiola litoralis* | Corrigiola litoralis L. subsp. litoralis | Caryophyllaceae | Hemicriptófito | SW Euroasiático e subsaria | I-XII |
| *Crataegus monogyna* | Crataegus monogyna Jacq. | Rosaceae | Microfanerófito | Cosmopolita | IV-V |
| *Crepis capillaris* | Crepis capillaris (L.) Wallr. | Asteraceae | Terófito | SW Euroasiático | IV-X |
| *Cruciata laevipes* | Cruciata laevipes Opiz | Rubiaceae | Caméfito | Subcosmopolita | IV-VIII |
| *Cucubalus baccifer* | Cucubalus baccifer L. | Caryophyllaceae | Hemicriptófito | Euroasiático | V-IX |
| *Cydonia oblonga* | Cydonia oblonga Mill. | Rosaceae | Microfanerófito | Exótico | IV-V |
| *Cynodon dactylon* | Cynodon dactylon (L.) Pers. | Poaceae | Hemicriptófito | Cosmopolita | V-IX |
| *Cynosurus cristatus* | Cynosurus cristatus L. | Poaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | VI-VII |
| *Cynosurus echinatus* | Cynosurus echinatus L. | Poaceae | Terófito | Euroasiático | V-VII |
| *Cyperus eragrostis* | Cyperus eragrostis Lam. | Cyperaceae | Geófito | Exótico | VI-IX |
| *Cyperus longus* | Cyperus longus L. | Cyperaceae | Geófito | W Euroasiático | IV-IX |
| *Cystopteris fragilis* | Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. fragilis | Athyriaceae | Geófito | Cosmopolita | III-IX |
| *Cytisus multiflorus* | Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet | Fabaceae | Nanofanerófito | Endémico | IV-VI |
| *Cytisus scoparius* | Cytisus scoparius (L.) Link | Fabaceae | Nanofanerófito | W Euroasiático | IV-VI |
| *Cytisus striatus* | Cytisus striatus (Hill) Rothm. | Fabaceae | Nanofanerófito | Endémico | IV-VI |
| *Dactylis lusitanica* | Dactylis glomerata subsp. lusitanica Stebbins & Zohary | Poaceae | Hemicriptófito | Endémico | V-VIII |
| *Daphne gnidium* | Daphne gnidium L. | Thymelaeaceae | Nanofanerófito | Submediterrânico | VI-X |
| *Daucus carota* | Daucus carota L. | Apiaceae | Hemicriptófito | Euroasiático | IV-VIII |
| *Delphinium staphisagria* | Delphinium staphisagria L. | Ranunculaceae | Hemicriptófito | Submediterrânico | VI-VIII |
| *Digitalis purpurea* | Digitalis purpurea L. subsp. purpurea | Scrophulariaceae | Hemicriptófito | Atlântico | IV-IX |
| *Digitalis thapsi* | Digitalis thapsi L. | Scrophulariaceae | Hemicriptófito | Endémico | V-VIII |
| *Dittrichia viscosa* | Dittrichia viscosa (L.) Greuter subsp. viscosa | Asteraceae | Caméfito | Mediterrânico | VI-X |
| *Dryopteris borreri* | Dryopteris affinis subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenkins | Aspidiaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | V-XI |
| *Echinochloa crus-galli* | Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. | Poaceae | Terófito | Subcosmopolita | VI-X |
| *Echium lusitanicum* | Echium lusitanicum L. | Boraginaceae | Hemicriptófito | Endémico | V-IX |
| *Echium plantagineum* | Echium plantagineum L. | Boraginaceae | Hemicriptófito | SW Euroasiático | III-VII |
| *Echium rosulatum* | Echium rosulatum Lange | Boraginaceae | Hemicriptófito | Endémico | V-X |
| *Eleocharis palustris* | Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. | Cyperaceae | Helófito | W Euroasiático | III-V |
| *Epilobium hirsutum* | Epilobium hirsutum L. | Onagraceae | Hemicriptófito | Subcosmopolita | VI - X |
| *Epilobium obscurum* | Epilobium obscurum Schreb. | Onagraceae | Hemicriptófito | Euroasiático | VI-XI |
| *Epilobium parviflorum* | Epilobium parviflorum Schreb. | Onagraceae | Hemicriptófito | Euroasiático | VI-IX |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Equisetum ramosissimum* | Equisetum ramosissimum Desf. | Equisetaceae | Geófito | Cosmopolita | II-VIII |
| *Erodium moschatum* | Erodium moschatum (L.) L'Hér. | Geraniaceae | Terófito | SW Euroasiático | III-VIII |
| *Eryngium tenue* | Eryngium tenue Lam. | Apiaceae | Terófito | Endémico | VI-VII |
| *Erysimum linifolium* | Erysimum linifolium (Pourr. ex Pers.) J. Gay | Brassicaceae | Caméfito | Endémico | III-VI |
| *Eupatorium cannabinum* | Eupatorium cannabinum L. | Asteraceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | VI-IX |
| *Euphorbia amygdaloides* | Euphorbia amygdaloides L. | Euphorbiaceae | Caméfito | W Euroasiático | IV-VIII |
| *Euphorbia characias* | Euphorbia characias L. | Euphorbiaceae | Caméfito | Subendémico | I - VII |
| *Euphorbia helioscopia* | Euphorbia helioscopia L. | Euphorbiaceae | Terófito | Euroasiático | I-V |
| *Euphorbia oxyphylla* | Euphorbia oxyphylla Boiss. in DC. | Euphorbiaceae | Geófito | Endémico | IV-V |
| *Euphorbia segetalis* | Euphorbia segetalis L. | Euphorbiaceae | Caméfito | W Euroasiático | III-X |
| *Fallopia convolvulus* | Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve | Polygonaceae | Terófito | Cosmopolita | V - X |
| *Festuca ampla* | Festuca ampla Hack. subsp. ampla | Poaceae | Hemicriptófito | Endémico | IV-VI |
| *Festuca duriotagana* | Festuca duriotagana Franco & Rocha Afonso | Poaceae | Hemicriptófito | Endémico | IV-VI |
| *Festuca mediterranea* | Festuca arundinacea subsp. mediterranea (Hack.) Franco & Rocha Afonso | Poaceae | Hemicriptófito | W Mediterrânico | IV-VII |
| *Ficus carica* | Ficus carica L. | Moraceae | Microfanerófito | Mediterrânico | V-IX |
| *Filago atlantica* | Filago lutescens subsp. atlantica Wagenitz | Asteraceae | Terófito | SW Euroasiático | VI-IX |
| *Filipendula ulmaria* | Filipendula ulmaria (L.) Maxim. | Rosaceae | Caméfito | Subcosmopolita | VI-X |
| *Foeniculum vulgare* | Foeniculum vulgare Mill. | Apiaceae | Hemicriptófito | Mediterrânico | VI-VIII |
| *Frangula alnus* | Frangula alnus Mill. | Rhamnaceae | Microfanerófito | W Euroasiático | V-VIII |
| *Fraxinus angustifolia* | Fraxinus angustifolia Vahl | Oleaceae | Mesofanerófito | SW Euroasiático | II-III |
| *Fumaria bastardii* | Fumaria bastardii Boreau | Papaveraceae | Terófito | Submediterrânico | II-VIII |
| *Fumaria muralis* | Fumaria muralis Sond. ex W. D. J. Koch | Papaveraceae | Terófito | Atlântico | I-VIII |
| *Fumaria officinalis* | Fumaria officinalis L. | Papaveraceae | Terófito | W Euroasiático | II-VII |
| *Galactites tomentosa* | Galactites tomentosa Moench | Asteraceae | Terófito | Submediterrânico | IV-VII |
| *Galinsoga ciliata* | Galinsoga ciliata (Rafin.) S. F. Blake | Asteraceae | Terófito | Exótico | V-X |
| *Galium aparine* | Galium aparine L. | Rubiaceae | Terófito | W Euroasiático | III-VII |
| *Galium australe* | Galium glaucum subsp. australe Franco | Rubiaceae | Caméfito | Endémico | V-VII |
| *Galium helodes* | Galium papillosum Lapeyr. subsp. helodes (Hoffmanns. & Link) Ortega Oliv. | Rubiaceae | Caméfito | Endémico | V-VIII |
| *Galium lucidum* | Galium lucidum subsp. lucidum All. | Rubiaceae | Caméfito | Submediterrânico | V-VIII |
| *Galium mollugo* | Galium mollugo L. | Rubiaceae | Geófito | W Euroasiático | V-VIII |
| *Galium palustre* | Galium palustre L. | Rubiaceae | Geófito | Cosmopolita | V - VIII |
| *Galium parisiense* | Galium parisiense L. | Rubiaceae | Terófito | SW Euroasiático | IV-VII |
| *Galium verum* | Galium verum L. | Rubiaceae | Caméfito | Euroasiático | VI-VIII |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Gastridium ventricosum* | Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. | Poaceae | Terófito | Submediterrânico | IV-VIII |
| *Gaudinia fragilis* | Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv. | Poaceae | Terófito | W Euroasiático | V-VI |
| *Genista falcata* | Genista falcata Brot. | Fabaceae | Nanofanerófito | Endémico | III-VI |
| *Geranium columbinum* | Geranium columbinum L. | Geraniaceae | Terófito | SW Euroasiático | IV-VII |
| *Geranium dissectum* | Geranium dissectum L. | Geraniaceae | Terófito | CW Euroasiático | III-VII |
| *Geranium lucidum* | Geranium lucidum L. | Geraniaceae | Terófito | CW Euroasiático | IV-VII |
| *Geranium lusitanicum* | Geranium pyrenaicum subsp. lusitanicum (Samp.) S. Ortiz | Geraniaceae | Hemicriptófito | Endémico | VI-VII |
| *Geranium molle* | Geranium molle L. | Geraniaceae | Terófito | SW Euroasiático | III-VI |
| *Geranium purpureum* | Geranium purpureum L. | Geraniaceae | Terófito | W Euroasiático | III-VII |
| *Geranium rotundifolium* | Geranium rotundifolium L. | Geraniaceae | Terófito | CW Euroasiático | III-VIII |
| *Geum urbanum* | Geum urbanum L. | Rosaceae | Hemicriptófito | Cosmopolita | V - VII |
| *Glyceria declinata* | Glyceria declinata Bréb. | Poaceae | Hemicriptófito | Cosmopolita | IV-IX |
| *Hedera hibernica* | Hedera hibernica (G.Kirchn.) Bean | Araliaceae | Microfanerófito | Atlântico | IX-XI |
| *Hirschfeldia incana* | Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. | Brassicaceae | Hemicriptófito | Mediterrânico | IV-IX |
| *Holcus duriensis* | Holcus annuus subsp. duriensis (P.Silva) Franco & Rocha Afonso | Poaceae | Terófito | Endémico | V-VII |
| *Holcus lanatus* | Holcus lanatus L. | Poaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | VI-VIII |
| *Holcus mollis* | Holcus mollis L. | Poaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | VI-VIII |
| *Hordeum geniculatum* | Hordeum geniculatum All. | Poaceae | Terófito | Cosmopolita | V-VIII |
| *Hordeum leporinum* | Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcang. | Poaceae | Terófito | SW Euroasiático | IV-VII |
| *Humulus lupulus* | Humulus lupulus L. | Cannabaceae | Geófito | Subcosmopolita | VI-VIII |
| *Hypericum perforatum* | Hypericum perforatum L. | Clusiaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | V-X |
| *Hypericum undulatum* | Hypericum undulatum Schousb. ex Willd. | Clusiaceae | Hemicriptófito | Atlântico | VII-IX |
| *Hypochaeris radicata* | Hypochaeris radicata L. | Asteraceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | IV-XI |
| *Juglans regia* | Juglans regia L. | Juglandaceae | Mesofanerófito | Submediterrânico | IV-V |
| *Juncus bufonius* | Juncus bufonius L. | Juncaceae | Terófito | Cosmopolita | III-VII |
| *Juncus conglomeratus* | Juncus conglomeratus L. | Juncaceae | Hemicriptófito | Subcosmopolita | IV-VII |
| *Juncus effusus* | Juncus effusus L. | Juncaceae | Hemicriptófito | Cosmopolita | V-IX |
| *Juniperus oxycedrus* | Juniperus oxycedrus L. | Cupressaceae | Mesofanerófito | Endémico | IV-V |
| *Lactuca serriola* | Lactuca serriola L. | Asteraceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | VI-VIII |
| *Lactuca viminea* | Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl | Asteraceae | Hemicriptófito | SW Euroasiático | VI-X |
| *Lactuca virosa* | Lactuca virosa L. | Asteraceae | Hemicriptófito | SW Euroasiático | VII-IX |
| *Lamium maculatum* | Lamium maculatum L. | Lamiaceae | Geófito | W Euroasiático | IV-VII |
| *Laphangium luteoalbum* | Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev | Asteraceae | Terófito | Cosmopolita | IV - X |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Lapsana communis* | Lapsana communis L. | Asteraceae | Terófito | W Euroasiático | V-IX |
| *Lathyrus clymenum* | Lathyrus clymenum L. | Fabaceae | Terófito | SW Euroasiático | III-VII |
| *Lavandula pedunculata* | Lavandula pedunculata (Mill.) Cav. | Lamiaceae | Caméfito | Endémico | II-IX |
| *Lavatera cretica* | Lavatera cretica L. | Malvaceae | Terófito | Submediterrânico | IV-VII |
| *Leersia oryzoides* | Leersia oryzoides (L.) Sw. | Poaceae | Helófito | Cosmopolita | VII-IX |
| *Lemna gibba* | Lemna gibba L. | Araceae | Hidrófito | Cosmopolita | I-XII |
| *Lemna minor* | Lemna minor L. | Araceae | Hidrófito | Subcosmopolita | II - X |
| *Leontodon taraxacoides* | Leontodon taraxacoides (Vill.) Marat | Asteraceae | Hemicriptófito | SW Euroasiático | IV-VII |
| *Lepidium heterophyllum* | Lepidium heterophyllum Benth. | Brassicaceae | Geófito | SW Euroasiático | IV-VII |
| *Ligustrum vulgare* | Ligustrum vulgare L. | Oleaceae | Microfanerófito | SW Euroasiático | V-VII |
| *Linum bienne* | Linum bienne Mill. | Linaceae | Hemicriptófito | Submediterrânico | II-VI |
| *Lolium aristatum* | Lolium aristatum (Willd.) Lang. | Poaceae | Hemicriptófito | Mediterrânico | IV-VII |
| *Lolium perenne* | Lolium perenne L. | Poaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | V-VIII |
| *Lolium rigidum* | Lolium rigidum Gaudin | Poaceae | Terófito | S Euroasiático | V-VI |
| *Lonicera hispanica* | Lonicera periclymenum L. subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) Nyman | Caprifoliaceae | Microfanerófito | Endémico | V-VII |
| *Lotus castellanus* | Lotus castellanus Boiss. & Reut. | Fabaceae | Terófito | Subendémico | V-IX |
| *Lotus pedunculatus* | Lotus pedunculatus Cav. | Fabaceae | Geófito | SW Euroasiático | III-VIII |
| *Lotus uliginosus* | Lotus uliginosus Schkuhr | Fabaceae | Geófito | W Mediterrânico | III-VIII |
| *Lycium europaeum* | Lycium europaeum L. | Solanaceae | Nanofanerófito | Submediterrânico | III-XI |
| *Lycopsis arvensis* | Lycopsis arvensis L. | Boraginaceae | Terófito | W Euroasiático | V-VIII |
| *Lycopus europaeus* | Lycopus europaeus L. | Lamiaceae | Hemicriptófito | Euroasiático | VII-IX |
| *Lysimachia vulgaris* | Lysimachia vulgaris L. | Primulaceae | Caméfito | W Euroasiático | V-VII |
| *Lythrum hyssopifolia* | Lythrum hyssopifolia L. | Lythraceae | Terófito | Cosmopolita | V-VII |
| *Lythrum portula* | Lythrum portula (L.) D.A.Webb | Lythraceae | Terófito | Subcosmopolita | VI-VIII |
| *Lythrum salicaria* | Lythrum salicaria L. | Lythraceae | Helófito | Cosmopolita | VI-VIII |
| *Malva nicaeensis* | Malva nicaeensis All. | Malvaceae | Caméfito | Submediterrânico | IV - VII |
| *Malva sylvestris* | Malva sylvestris L. | Malvaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | IV-IX |
| *Malva tournefortiana* | Malva tournefortiana L. | Malvaceae | Hemicriptófito | Endémico | V-VII |
| *Margotia gummifera* | Margotia gummifera (Desf.) Lange | Apiaceae | Hemicriptófito | Endémico | VI-IX |
| *Medicago polymorpha* | Medicago polymorpha L. | Fabaceae | Terófito | SW Euroasiático | III-VII |
| *Melica ciliata* | Melica ciliata subsp. magnolii (Gren. & Godr.) Husn. | Poaceae | Hemicriptófito | W Mediterrânico | V-VIII |
| *Melilotus spicatus* | Melilotus spicatus (Sm.) Breistr. | Fabaceae | Terófito | Submediterrânico | IV-VII |
| *Mentha aquatica* | Mentha aquatica L. | Lamiaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | VII-X |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Mentha pulegium* | Mentha pulegium L. | Lamiaceae | Hemicriptófito | SW Euroasiático | VI-VIII |
| *Mentha suaveolens* | Mentha suaveolens Ehrh. | Lamiaceae | Hemicriptófito | SW Euroasiático | VII-X |
| *Mercurialis ambigua* | Mercurialis ambigua L. f. | Euphorbiaceae | Terófito | W Mediterrânico | I-XII |
| *Micropyrum tenellum* | Micropyrum tenellum (L.) Link | Poaceae | Terófito | SW Euroasiático | IV-VII |
| *Misopates orontium* | Misopates orontium (L.) Raf. | Scrophulariaceae | Terófito | SW Euroasiático | III-VIII |
| *Montia perfoliata* | Montia perfoliata (Donn ex Willd.) Howell | Portulacaceae | Terófito | Exótico | IV-VII |
| *Morus alba* | Morus alba L. | Moraceae | Mesofanerófito | Exótico | V |
| *Myosotis gracillima* | Myosotis ramosissima subsp. gracillima (Loscos & J. Pardo) Rivas Mart. | Boraginaceae | Terófito | Atlântico | III-VI |
| *Myosotis stolonifera* | Myosotis stolonifera (DC.) Leresche & Levier | Boraginaceae | Helófito | Endémico | V-VIII |
| *Myrrhoides nodosa* | Myrrhoides nodosa (L.) Cannon | Apiaceae | Terófito | W Euroasiático | V-VII |
| *Oenanthe crocata* | Oenanthe crocata L. | Apiaceae | Geófito | Atlântico | IV-VI |
| *Olea europaea* | Olea europaea L. | Oleaceae | Microfanerófito | Mediterrânico | V-VII |
| *Ononis spinosa* | Ononis spinosa L. | Fabaceae | Caméfito | W Euroasiático | V-VII |
| *Ornithogalum pyrenaicum* | Ornithogalum pyrenaicum L. | Liliaceae | Geófito | SW Euroasiático | V-VII |
| *Ornithopus perpusillus* | Ornithopus perpusillus L. | Fabaceae | Terófito | W Euroasiático | IV-VII |
| *Orobanche hederae* | Orobanche hederae Vaucher ex Duby | Orobanchaceae | Geófito | W Euroasiático | IV-X |
| *Osyris alba* | Osyris alba L. | Santalaceae | Nanofanerófito | Submediterrânico | IV-VII |
| *Oxalis corniculata* | Oxalis corniculata L. | Oxalidaceae | Geófito | Exótico | I-XII |
| *Papaver hybridum* | Papaver hybridum L. | Papaveraceae | Terófito | SW Euroasiático | III-VII |
| *Papaver rhoeas* | Papaver rhoeas L. | Papaveraceae | Terófito | Euroasiático | IV-VII |
| *Parentucellia viscosa* | Parentucellia viscosa (L.) Caruel | Scrophulariaceae | Terófito | SW Euroasiático | III-VII |
| *Parietaria judaica* | Parietaria judaica L. | Urticaceae | Hemicriptófito | Submediterrânico | III-IX |
| *Parietaria lusitanica* | Parietaria lusitanica L. | Urticaceae | Terófito | Mediterrânico | V-VII |
| *Paspalum paspalodes* | Paspalum paspalodes (Michx) Schribner | Poaceae | Caméfito | Exótico | VIII-IX |
| *Pentaglottis sempervirens* | Pentaglottis sempervirens (L.) L.H.Bailey | Boraginaceae | Hemicriptófito | Mediterrânico | VI-VII |
| *Phagnalon saxatile* | Phagnalon saxatile (L.) Cass. | Asteraceae | Caméfito | Mediterrânico | III-VIII |
| *Phalaris aquatica* | Phalaris aquatica L. | Poaceae | Hemicriptófito | Submediterrânico | IV-VI |
| *Phalaris arundinacea* | Phalaris arundinacea L. | Poaceae | Helófito | Cosmopolita | VI-VIII |
| *Phalaris minor* | Phalaris minor Retz | Poaceae | Terófito | Submediterrânico | IV-VI |
| *Phytolacca americana* | Phytolacca americana L. | Phytolaccaceae | Hemicriptófito | Exótico | V-VIII |
| *Picris echioides* | Picris echioides L. | Asteraceae | Hemicriptófito | Mediterrânico | V-VII |
| *Pimpinella villosa* | Pimpinella villosa Schousb. | Apiaceae | Hemicriptófito | Endémico | VII-IX |
| *Pistacia terebinthus* | Pistacia terebinthus L. | Anacardiaceae | Microfanerófito | Mediterrânico | IV-V |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Plantago coronopus* | Plantago coronopus L. | Plantaginaceae | Hemicriptófito | Atlântico | I-XII |
| *Plantago lagopus* | Plantago lagopus L. | Plantaginaceae | Hemicriptófito | Mediterrânico | I - XII |
| *Plantago lanceolata* | Plantago lanceolata L. | Plantaginaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | IV-VI |
| *Plantago major* | Plantago major L. | Plantaginaceae | Hemicriptófito | Cosmopolita | V - X |
| *Platanus hispanica* | Platanus hispanica Mill. ex Münchh. | Platanaceae | Mesofanerófito | Ornamental | IV-VI |
| *Poa annua* | Poa annua L. | Poaceae | Terófito | W Euroasiático | I-XII |
| *Poa trivialis* | Poa trivialis L. | Poaceae | Hemicriptófito | Euroasiático | IV-VI |
| *Polycarpon tetraphyllum* | Polycarpon tetraphyllum (L.) L. | Caryophyllaceae | Terófito | S Euroasiático | IV-IX |
| *Polygonum aviculare* | Polygonum aviculare L. | Polygonaceae | Terófito | Cosmopolita | VI-X |
| *Polygonum hydropiper* | Polygonum hydropiper L. | Polygonaceae | Terófito | Subcosmopolita | VII-X |
| *Polygonum lapathifolium* | Polygonum lapathifolium L. | Polygonaceae | Terófito | Subcosmopolita | VII-X |
| *Polygonum persicaria* | Polygonum persicaria L. | Polygonaceae | Terófito | Cosmopolita | VI-XI |
| *Polypodium interjectum* | Polypodium interjectum Shivas | Polypodiaceae | Geófito | W Euroasiático | I-XII |
| *Polypogon monspeliensis* | Polypogon monspeliensis (L.) Desf. | Poaceae | Terófito | Euroasiático | V-VII |
| *Polystichum setiferum* | Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn. | Aspidiaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | IV-VIII |
| *Populus alba* | Populus alba L. | Salicaceae | Megafanerófito | Submediterrânico | I-III |
| *Populus nigra* | Populus nigra L. | Salicaceae | Megafanerófito | SW Euroasiático | II-IV |
| *Portulaca oleracea* | Portulaca oleracea L. | Portulacaceae | Terófito | Euroasiático | V-IX |
| *Potentilla reptans* | Potentilla reptans L. | Rosaceae | Geófito | Euroasiático | V-VII |
| *Prunella vulgaris* | Prunella vulgaris L. | Lamiaceae | Hemicriptófito | SW Euroasiático | III-VIII |
| *Prunus dulcis* | Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb | Rosaceae | Microfanerófito | Exótico | III-IV |
| *Prunus insititia* | Prunus insititia L. | Rosaceae | Microfanerófito | SW Euroasiático | III-IV |
| *Prunus mahaleb* | Prunus mahaleb L. | Rosaceae | Microfanerófito | Submediterrânico | III-VI |
| *Prunus spinosa* | Prunus spinosa L. | Rosaceae | Nanofanerófito | SW Euroasiático | III-IV |
| *Pteridium aquilinum* | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Hypolepidaceae | Geófito | Cosmopolita | III-IX |
| *Pulicaria paludosa* | Pulicaria paludosa Link | Asteraceae | Terófito | Endémico | VI-IX |
| *Quercus faginea* | Quercus faginea Lam. subsp. faginea | Fagaceae | Mesofanerófito | Endémico | IV-VI |
| *Quercus rotundifolia* | Quercus rotundifolia Lam. | Fagaceae | Mesofanerófito | W Mediterrânico | III-VI |
| *Quercus suber* | Quercus suber L. | Fagaceae | Mesofanerófito | W Mediterrânico | IV-VII |
| *Ranunculus parviflorus* | Ranunculus parviflorus L. | Ranunculaceae | Terófito | Subatlântico | II-VII |
| *Ranunculus peltatus* | Ranunculus peltatus Schrank | Ranunculaceae | Helófito | Submediterrânico | II-VII |
| *Ranunculus repens* | Ranunculus repens L. | Ranunculaceae | Geófito | Euroasiático | III-VIII |
| *Ranunculus trilobus* | Ranunculus trilobus Desf. | Ranunculaceae | Terófito | Submediterrânico | III-VII |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Raphanus raphanistrum* | Raphanus raphanistrum L. | Brassicaceae | Terófito | SW Euroasiático | IV-XI |
| *Reseda luteola* | Reseda luteola L. | Resedaceae | Hemicriptófito | SW Euroasiático | IV-IX |
| *Retama sphaerocarpa* | Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. | Fabaceae | Nanofanerófito | Endémico | IV-VII |
| *Rorippa nasturtium-aquaticum* | Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek | Brassicaceae | Helófito | Euroasiático | I-XII |
| *Rorippa sylvestris* | Rorippa sylvestris (L.) Besser | Brassicaceae | Helófito | W Euroasiático | V-X |
| *Rosa blondaeana* | Rosa blondaeana Ripart ex Déségl. | Rosaceae | Microfanerófito | CW Euroasiático | IV-VII |
| *Rosa canina* | Rosa canina L. | Rosaceae | Microfanerófito | CW Euroasiático | IV-VII |
| *Rosa micrantha* | Rosa micrantha Borrer ex Sm. | Rosaceae | Nanofanerófito | W Euroasiático | III-VII |
| *Rosa pouzinii* | Rosa pouzinii Tratt. | Rosaceae | Nanofanerófito | Submediterrânico | V-VII |
| *Rosa tomentosa* | Rosa tomentosa Sm. | Rosaceae | Microfanerófito | W Euroasiático | VI-VIII |
| *Rubia peregrina* | Rubia peregrina L. | Rubiaceae | Caméfito | Submediterrânico | IV-VII |
| *Rubus lainzii* | Rubus lainzii H.E. Weber | Rosaceae | Microfanerófito | Endémico | VI-VII |
| *Rubus sampaioanus* | Rubus sampaioanus Sudre ex Samp. | Rosaceae | Microfanerófito | Endémico | V-VII |
| *Rubus ulmifolius* | Rubus ulmifolius Schott | Rosaceae | Microfanerófito | Subatlântico | V-VIII |
| *Rumex bucephalophorus* | Rumex bucephalophorus L. | Polygonaceae | Terófito | Endémico | IV-VI |
| *Rumex conglomeratus* | Rumex conglomeratus Murray | Polygonaceae | Hemicriptófito | CW Euroasiático | VI-IX |
| *Rumex crispus* | Rumex crispus L. | Polygonaceae | Hemicriptófito | Subcosmopolita | VI-VIII |
| *Rumex induratus* | Rumex induratus Boiss. & Reut. | Polygonaceae | Caméfito | Endémico | V-VIII |
| *Rumex obtusifolius* | Rumex obtusifolius L. | Polygonaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | VI-VII |
| *Rumex papillaris* | Rumex papillaris Boiss. & Reut. | Polygonaceae | Hemicriptófito | Endémico | VI-VIII |
| *Rumex pulcher* | Rumex pulcher L. | Polygonaceae | Hemicriptófito | SW Euroasiático | IV-VII |
| *Ruscus aculeatus* | Ruscus aculeatus L. | Liliaceae | Nanofanerófito | Submediterrânico | III-VII |
| *Salix alba* | Salix alba L. | Salicaceae | Mesofanerófito | CW Euroasiático | III-IV |
| *Salix atrocinerea* | Salix atrocinerea Brot. | Salicaceae | Microfanerófito | Atlântico | II-III |
| *Salix fragilis* | Salix fragilis L. | Salicaceae | Mesofanerófito | W Euroasiático | III-V |
| *Salix salviifolia* | Salix salviifolia Brot. | Salicaceae | Microfanerófito | Endémico | III-IV |
| *Salix viminalis* | Salix viminalis L. | Salicaceae | Mesofanerófito | W Euroasiático | III-IV |
| *Sambucus ebulus* | Sambucus ebulus L. | Caprifoliaceae | Hemicriptófito | SW Euroasiático | VI-IX |
| *Sambucus nigra* | Sambucus nigra L. | Caprifoliaceae | Microfanerófito | W Euroasiático | IV-VIII |
| *Sanguisorba verrucosa* | Sanguisorba verrucosa (Link ex G.Don) Ces. | Rosaceae | Hemicriptófito | SW Euroasiático | IV-VII |
| *Saponaria officinalis* | Saponaria officinalis L. | Caryophyllaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | VI-IX |
| *Scirpoides holoschoenus* | Scirpoides holoschoenus (L.) Soják | Cyperaceae | Caméfito | W Euroasiático | IV-IX |
| *Scolymus hispanicus* | Scolymus hispanicus L. | Asteraceae | Terófito | Mediterrânico | V-X |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Scrophularia scorodonia* | Scrophularia scorodonia L. | Scrophulariaceae | Hemicriptófito | Atlântico | II-IX |
| *Sedum amplexicaule* | Sedum amplexicaule DC. | Crassulaceae | Hemicriptófito | Mediterrânico | VI-VII |
| *Sedum arenarium* | Sedum arenarium Brot. | Crassulaceae | Terófito | Endémico | VI-VIII |
| *Sedum forsterianum* | Sedum forsterianum Sm. | Crassulaceae | Hemicriptófito | Atlântico | IV-VII |
| *Sedum hirsutum* | Sedum hirsutum All. | Crassulaceae | Hemicriptófito | W Mediterrânico | VI-VIII |
| *Setaria viridis* | Setaria viridis (L.) P. Beauv. | Poaceae | Terófito | Cosmopolita | VI-VII |
| *Sherardia arvensis* | Sherardia arvensis L. | Rubiaceae | Terófito | W Euroasiático | II-VI |
| *Silene gallica* | Silene gallica L. | Caryophyllaceae | Terófito | Subcosmopolita | II-VI e X-XI |
| *Silene inaperta* | Silene inaperta L. | Caryophyllaceae | Terófito | W Mediterrânico | V-VII |
| *Silene latifolia* | Silene latifolia Poir. | Caryophyllaceae | Hemicriptófito | Subcosmopolita | IV-VIII |
| *Silene nutans* | Silene nutans L. | Caryophyllaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | V-VII |
| *Silene vulgaris* | Silene vulgaris (Moench) Garcke | Caryophyllaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | IV-X |
| *Silybum marianum* | Silybum marianum (L.) Gaertn. | Asteraceae | Hemicriptófito | Mediterrânico | IV-VI |
| *Sisymbrium officinale* | Sisymbrium officinale (L.) Scop. | Brassicaceae | Terófito | W Euroasiático | III-IX |
| *Solanum dulcamara* | Solanum dulcamara L. | Solanaceae | Caméfito | Cosmopolita | VI - IX |
| *Solanum nigrum* | Solanum nigrum L. | Solanaceae | Terófito | Cosmopolita | IV-XI |
| *Sonchus asper* | Sonchus asper (L.) Hill | Asteraceae | Terófito | W Euroasiático | IX-VI |
| *Sonchus oleraceus* | Sonchus oleraceus L. | Asteraceae | Terófito | W Euroasiático | III-XI |
| *Spergularia purpurea* | Spergularia purpurea (Pers.) D. Don | Caryophyllaceae | Hemicriptófito | Endémico | III-IX |
| *Stellaria graminea* | Stellaria graminea L. | Caryophyllaceae | Hemicriptófito | Euroasiático | V-VIII |
| *Stellaria pallida* | Stellaria pallida (Dumort.) Piré | Caryophyllaceae | Hemicriptófito | SW Euroasiático | I-VI |
| *Tamarix africana* | Tamarix africana Poir. | Tamaricaceae | Microfanerófito | Mediterrânico | III - VI |
| *Tamarix mascatensis* | Tamarix mascatensis Bunge | Tamaricaceae | Microfanerófito | Submediterrânico | III-VII |
| *Tamus communis* | Tamus communis L. | Dioscoreaceae | Geófito | W Euroasiático | III-VI |
| *Teucrium scorodonia* | Teucrium scorodonia L. | Lamiaceae | Hemicriptófito | SW Euroasiático | VI-IX |
| *Thalictrum speciosissimum* | Thalictrum speciosissimum L. in Loefl. | Ranunculaceae | Hemicriptófito | Endémico | V-VII |
| *Thapsia villosa* | Thapsia villosa L. | Apiaceae | Hemicriptófito | Subendémico | III-VII |
| *Tolpis barbata* | Tolpis barbata (L.) Gaertn. | Asteraceae | Terófito | Mediterrânico | IV-VII |
| *Tordylium maximum* | Tordylium maximum L. | Apiaceae | Terófito | W Euroasiático | IV-VII |
| *Torilis nodosa* | Torilis nodosa (L.) Gaertn. | Apiaceae | Terófito | Submediterrânico | IV-IX |
| *Torilis purpurea* | Torilis arvensis subsp. purpurea (Ten.) Hayek | Apiaceae | Terófito | Submediterrânico | IV-VI |
| *Torilis recta* | Torilis arvensis subsp. recta Jury | Apiaceae | Terófito | SW Euroasiático | IV-VII |
| *Trifolium angustifolium* | Trifolium angustifolium L. | Fabaceae | Terófito | Submediterrânico | V-VII |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Trifolium arvense* | Trifolium arvense L. | Fabaceae | Terófito | W Euroasiático | IV-VI |
| *Trifolium campestre* | Trifolium campestre Schreb. | Fabaceae | Terófito | W Euroasiático | III-IX |
| *Trifolium cernuum* | Trifolium cernuum Brot. | Fabaceae | Terófito | Submediterrânico | IV-VII |
| *Trifolium dubium* | Trifolium dubium Sibth. | Fabaceae | Terófito | W Euroasiático | IV-VIII |
| *Trifolium glomeratum* | Trifolium glomeratum L. | Fabaceae | Terófito | SW Euroasiático | IV-VII |
| *Trifolium hirtum* | Trifolium hirtum All. | Fabaceae | Terófito | Mediterrânico | IV-VIII |
| *Trifolium pratense* | Trifolium pratense L. | Fabaceae | Hemicriptófito | CW Euroasiático | V-X |
| *Trifolium repens* | Trifolium repens L. | Fabaceae | Caméfito | W Euroasiático | III-VIII |
| *Trifolium resupinatum* | Trifolium resupinatum L. | Fabaceae | Terófito | Submediterrânico | IV-VI |
| *Typha domingensis* | Typha domingensis Pers. | Typhaceae | Hidrófito | Subcosmopolita | V-VIII |
| *Ulmus minor* | Ulmus minor Mill. | Ulmaceae | Mesofanerófito | Subcosmopolita | II-III |
| *Umbilicus rupestris* | Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy | Crassulaceae | Hemicriptófito | Submediterrânico | V-VI |
| *Urginea maritima* | Urginea maritima (L.) Baker | Liliaceae | Geófito | Mediterrânico | VIII-X |
| *Urtica dioica* | Urtica dioica L. | Urticaceae | Hemicriptófito | Cosmopolita | V-VI |
| *Urtica membranacea* | Urtica membranacea Poir. | Urticaceae | Terófito | Mediterrânico | II-IX |
| *Urtica urens* | Urtica urens L. | Urticaceae | Terófito | W Euroasiático | III-IX |
| *Verbascum pulverulentum* | Verbascum pulverulentum Vill. | Scrophulariaceae | Hemicriptófito | SW Euroasiático | VI-IX |
| *Verbena officinalis* | Verbena officinalis L. | Verbenaceae | Hemicriptófito | Subcosmopolita | VI-XII |
| *Veronica anagallis-aquatica* | Veronica anagallis-aquatica L. | Scrophulariaceae | Helófito | W Euroasiático | IV-IX |
| *Veronica arvensis* | Veronica arvensis L. | Scrophulariaceae | Terófito | W Euroasiático | III-VIII |
| *Vicia angustifolia* | Vicia angustifolia L. | Fabaceae | Terófito | CW Euroasiático | IV-VI |
| *Vicia cordata* | Vicia cordata Hoppe | Fabaceae | Terófito | SW Euroasiático | IV-VII |
| *Vicia dasycarpa* | Vicia dasycarpa Ten. | Fabaceae | Terófito | Submediterrânico | IV-VII |
| *Vicia disperma* | Vicia disperma DC. | Fabaceae | Terófito | W Mediterrânico | IV-VII |
| *Vicia lutea* | Vicia lutea L. | Fabaceae | Hemicriptófito | SW Euroasiático | III-VII |
| *Vinca difformis* | Vinca difformis Pourr. | Apocynaceae | Caméfito | W Mediterrânico | I-VII |
| *Viola palustris* | Viola palustris L. | Violaceae | Hemicriptófito | Subcosmopolita | VI-VIII |
| *Viola riviniana* | Viola riviniana Rchb. | Violaceae | Hemicriptófito | W Euroasiático | III-VIII |
| *Vitis vinifera* | Vitis vinifera L. | Vitaceae | Nanofanerófito | Exótico | V-VI |
| *Vulpia geniculata* | Vulpia geniculata (L.) Link | Poaceae | Terófito | Subendémico | III - VI |
| *Xanthium italicum* | Xanthium strumarium subsp. italicum (Moretti) Greuter | Asteraceae | Terófito | Exótico | VI-IX |
| *Xanthium spinosum* | Xanthium spinosum L. | Asteraceae | Terófito | Exótico | VI-X |

**A**, Anexo; **DH**, Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE); **EX**, Exóticas DL 565/99: **X**, presente; *****, prioritário

RELAPE: *****, flora RELAPE; **+**, flora pré-RELAPE

| **Binómio** | **Nome comum** | **RELAPE** | **A2 DH** | **A4 DH** | **A5 DH** | **A1 EX** | **A2 EX** | **A3 EX** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Adenocarpus complicatus* | Codeço-rasteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Adiantum capillus-veneris* | Avenca-das-fontes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Aegilops triuncialis* | Egilope-de-três-polegadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Agrimonia eupatoria* | Agrimónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Agrostis castellana* | Barbas-de-raposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Agrostis stolonifera* | Erva-fina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Alisma plantago-aquatica* | Tanchagem-da-água | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Alliaria petiolata* | Erva-dos-alhos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Allium pallens* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Allium paniculatum* | Alho-paniculado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Alnus glutinosa* | Amieiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Amaranthus albus* | Baldro-branco | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| *Amaranthus hybridus* | Bredo-vermelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Anagallis arvensis* | Morrião-vermelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Andryala integrifolia* | Tripa-de-ovelha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Andryala laxiflora* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Anogramma leptophylla* | Anograma-de-folha-estreita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Anthriscus caucalis* | Antriscos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Aphanes australis* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Apium nodiflorum* | Rabaça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Arabidopsis thaliana* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Arenaria leptoclados* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Arisarum simorrhinum* | Candeias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Aristolochia paucinervis* | Erva-bicha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Aristolochia pistolochia* | Pistolóquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Arrhenatherum album* | Balanquinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Arrhenatherum baeticum* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Arrhenatherum bulbosum* | Aveia-de-rosário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Arum italicum* | Jarro-bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Arundo donax* | Cana | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| *Asparagus acutifolius* | Espargo-bravo-menor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Asphodelus serotinus* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Asplenium billotii* | Fentilho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Asplenium onopteris* | Avenca-negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Asplenium trichomanes* | Avenca-brava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Athyrium filix-femina* | Feto-fêmea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Atriplex prostrata* | Armoles-bravos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Avena lusitanica* | Aveia-barbada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Avena macrantha* | Aveia-nua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Avena strigosa* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ballota nigra* | Marroio-negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Barbarea vulgaris* | Erva-de-Santa-Bárbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Bartsia trixago* | Flor-de-ouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Bellis perennis* | Bonina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Bidens frondosa* | Erva-rapa | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| *Bituminaria bituminosa* | Trevo-bituminoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Brachypodium pinnatum* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Brachypodium sylvaticum* | Braquipódio-bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Brassica barrelieri* | Labrêsto-de-flor-amarela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Briza maxima* | Bole-bole-maior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Briza minor* | Bole-bole-menor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Bromus diandrus* | Saruga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Bromus hordeaceus* | Bromo-cevada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Bromus sterilis* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Bryonia dioica* | Vide-branca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Bunias erucago* | Maçã-de-bedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Bupleurum gerardi* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Calendula arvensis* | Erva-vaqueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Callitriche brutia* | Morrugem-de-água | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Callitriche stagnalis* | Morrugem-de-água | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Calystegia sepium* | Bons-dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Campanula lusitanica* | Campainhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Campanula rapunculus* | Campainhas-rabanete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cardamine flexuosa* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cardamine hirsuta* | Agião-menor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Carduus tenuiflorus* | Cardo-anil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Carex cuprina* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Carex divisa* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Carex echinata* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Carex lusitanica* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Carex pairae* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Carex pendula* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Carex remota* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Carlina corymbosa* | Cardo-amarelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Carthamus lanatus* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Celtis australis* | Lodão-bastardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Centaurea langeana* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Centaurium majus* | Fel-da-terra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cerastium glomeratum* | Orelha-de-rato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Chaerophyllum temulum* | Salsa-de-burro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Chamaemelum mixtum* | Margaça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Chelidonium majus* | Celidónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Chenopodium album* | Catassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Chenopodium ambrosioides* | Ambrósia-do-México | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| *Chenopodium polyspermum* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Chondrilla juncea* | Leituga-branca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cichorium intybus* | Chicória-do-café | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cirsium arvense* | Cardo-das-vinhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cirsium vulgare* | Cardo-roxo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cistus psilosepalus* | Sanganho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Clematis campaniflora* | Vide-branca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Clinopodium vulgare* | Clinopódio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Coleostephus myconis* | Pampilho-de-micão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Conium maculatum* | Ansarina-malhada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Convolvulus arvensis* | Erva-garriola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Conyza albida* | Avoadinha-marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| *Conyza canadensis* | Avoadinha-do-Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| *Corrigiola litoralis* | Erva-pombinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Crataegus monogyna* | Pilriteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Crepis capillaris* | Barba-de-falcão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cruciata laevipes* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cucubalus baccifer* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cydonia oblonga* | Marmeleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| *Cynodon dactylon* | Pé-de-galinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cynosurus cristatus* | Rabo-de-cão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cynosurus echinatus* | Rabo-de cão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cyperus eragrostis* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cyperus longus* | Junça-ordinária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cystopteris fragilis* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cytisus multiflorus* | Giesta-branca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cytisus scoparius* | Giesta-negral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cytisus striatus* | Giesta-amarela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Dactylis lusitanica* | Panasco-das-moitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Daphne gnidium* | Trovisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Daucus carota* | Cenoura-brava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Delphinium staphisagria* | Paparraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Digitalis purpurea* | Dedaleira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Digitalis thapsi* | Dedaleira-amarela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Dittrichia viscosa* | Erva-dos-bálsamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Dryopteris borreri* | Falso-feto macho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Echinochloa crus-galli* | Meã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Echium lusitanicum* | Soajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Echium plantagineum* | Soagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Echium rosulatum* | Cardo-das-víboras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Eleocharis palustris* | Junco-marreco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Epilobium hirsutum* | Epilóbio-eriçado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Epilobium obscurum* | Erva-bonita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Epilobium parviflorum* | Epilóbio-de-flor-miúda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Equisetum ramosissimum* | Rabo-de-porco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erodium moschatum* | Agulheira-moscada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Eryngium tenue* | Cardete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erysimum linifolium* | Goivo-duriense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Eupatorium cannabinum* | Trevo-cervino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Euphorbia amygdaloides* | Eufórbia-de-bosque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Euphorbia characias* | Maleiteira-maior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Euphorbia helioscopia* | Erva-leiteira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Euphorbia oxyphylla* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Euphorbia segetalis* | Alforva-brava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Fallopia convolvulus* | Corriola-bastarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Festuca ampla* | Erva-carneira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Festuca duriotagana* | 0 | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Festuca mediterranea* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ficus carica* | Figueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Filago atlantica* | Erva-dos-moinhos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Filipendula ulmaria* | Erva-ulmeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Foeniculum vulgare* | Funcho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Frangula alnus* | Amieiro-negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Fraxinus angustifolia* | Freixo-de-folhas-estreitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Fumaria bastardii* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Fumaria muralis* | Mata-fogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Fumaria officinalis* | Catarinas-queimadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Galactites tomentosa* | Cardo-dos-picos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Galinsoga ciliata* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| *Galium aparine* | Amor-de-hortelão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Galium australe* | Solda-branca | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Galium helodes* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Galium lucidum* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Galium mollugo* | Solda-branca-da-montanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Galium palustre* | Solda-dos-charcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Galium parisiense* | Solda-de-Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Galium verum* | Erva-coalheira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Gastridium ventricosum* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Gaudinia fragilis* | Argençana-dos-pastores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Genista falcata* | Tojo-gadanho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Geranium columbinum* | Bico-de-pomba-maior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Geranium dissectum* | Bico-de-pomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Geranium lucidum* | Pampilho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Geranium lusitanicum* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Geranium molle* | Bico-de-pomba-menor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Geranium purpureum* | Bico-de-grou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Geranium rotundifolium* | Gerânio-peludo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Geum urbanum* | Erva-benta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Glyceria declinata* | Azevém-baboso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Hedera hibernica* | Hera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Hirschfeldia incana* | Ineixas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Holcus duriensis* | 0 | * | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Holcus lanatus* | Erva-serôdia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Holcus mollis* | Erva-molar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Hordeum geniculatum* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Hordeum leporinum* | Cevada-das-lebres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Humulus lupulus* | Lúpulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Hypericum perforatum* | Milfurada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Hypericum undulatum* | Hipericão-ondeado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Hypochaeris radicata* | Leituga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Juglans regia* | Nogueira-comum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| *Juncus bufonius* | Junco-dos-sapos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Juncus conglomeratus* | Junco-glomerado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Juncus effusus* | Junco-solto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Juniperus oxycedrus* | Zimbro-galego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lactuca serriola* | Alface-brava-menor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lactuca viminea* | Leituga-brava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lactuca virosa* | Alface-brava-maior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lamium maculatum* | Chuchas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Laphangium luteoalbum* | Perpétua-brava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Lapsana communis* | Labresto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lathyrus clymenum* | Cizirão-das-torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lavandula pedunculata* | Rosmarinho-maior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lavatera cretica* | Lavatera-silvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Leersia oryzoides* | "Rice cutgrass" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lemna gibba* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lemna minor* | Lentilhas-de-água-menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Leontodon taraxacoides* | Leituga-dos-montes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lepidium heterophyllum* | Lepídio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ligustrum vulgare* | Alfena | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Linum bienne* | Linhaça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lolium aristatum* | Azevém italiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lolium perenne* | Azevém-vivaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lolium rigidum* | Erva-febra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lonicera hispanica* | Madressilva-das-boticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lotus castellanus* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lotus pedunculatus* | Erva-coelheira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lotus uliginosus* | Erva-coelheira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lycium europaeum* | Cambroeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lycopsis arvensis* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lycopus europaeus* | Marroio-de-água | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lysimachia vulgaris* | Erva-moedeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lythrum hyssopifolia* | Salgueirinha-de-folha-de-hissopo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lythrum portula* | Patinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lythrum salicaria* | Salgueirinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Malva nicaeensis* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Malva sylvestris* | Malva-comum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Malva tournefortiana* | Malva-rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Margotia gummifera* | Bruco-fétido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Medicago polymorpha* | Carrapiço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Melica ciliata* | Mélica-ciliada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Melilotus spicatus* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Mentha aquatica* | Hortelã-dos-rios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Mentha pulegium* | Poêjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Mentha suaveolens* | Hortelã-comum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Mercurialis ambigua* | Urtiga-morta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Micropyrum tenellum* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Misopates orontium* | Focinho-de-rato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Montia perfoliata* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| *Morus alba* | Amoreira-branca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| *Myosotis gracillima* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Myosotis stolonifera* | Não-me-esqueças | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Myrrhoides nodosa* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Oenanthe crocata* | Prego-do-diabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Olea europaea* | Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ononis spinosa* | Unha-de-gato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ornithogalum pyrenaicum* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ornithopus perpusillus* | Serradela-miúda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Orobanche hederae* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Osyris alba* | Cássia-branca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Oxalis corniculata* | Trevo-azedo-corniculado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Papaver hybridum* | Papoila-peluda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Papaver rhoeas* | Papoila-das-searas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Parentucellia viscosa* | Erva-peganhenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Parietaria judaica* | Amarras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Parietaria lusitanica* | Parietária-portuguesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Paspalum paspalodes* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| *Pentaglottis sempervirens* | Olhos-de-gato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Phagnalon saxatile* | Alecrim-das-paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Phalaris aquatica* | Alpista-da-água | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Phalaris arundinacea* | Caniço-malhado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Phalaris minor* | Talaceiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Phytolacca americana* | Erva-tintureira | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| *Picris echioides* | Serralha-da-rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Pimpinella villosa* | Erva-doce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Pistacia terebinthus* | Cornalheira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Plantago coronopus* | Diabelha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Plantago lagopus* | Orelha-de-lebre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Plantago lanceolata* | Língua-de-ovelha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Plantago major* | Tanchagem-maior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Platanus hispanica* | Plátano | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| *Poa annua* | Pêlo-de-cão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Poa trivialis* | Panasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Polycarpon tetraphyllum* | Erva-dos-unheiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Polygonum aviculare* | Sempre-noiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Polygonum hydropiper* | Pimenta-da-água | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Polygonum lapathifolium* | Mal-casada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Polygonum persicaria* | Erva-pessegueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Polypodium interjectum* | Fentelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Polypogon monspeliensis* | Rabo-de-zorra-macio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Polystichum setiferum* | Fentenha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Populus alba* | Choupo-branco | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| *Populus nigra* | Choupo-negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Portulaca oleracea* | Beldroega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Potentilla reptans* | Quinquefólio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Prunella vulgaris* | Erva-férrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Prunus dulcis* | Amendoeira-doce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Prunus insititia* | Cagoiceiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Prunus mahaleb* | Cerejeira-de-Santa-Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Prunus spinosa* | Abrunheiro-bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Pteridium aquilinum* | Feto-ordinário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Pulicaria paludosa* | Erva-pulgueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Quercus faginea* | Carvalho-cerquinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Quercus rotundifolia* | Azinheira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Quercus suber* | Sobreiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ranunculus parviflorus* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ranunculus peltatus* | Borboleta-aquática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ranunculus repens* | Botão-de-oiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ranunculus trilobus* | Patalôco-verde-amarelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Raphanus raphanistrum* | Saramago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Reseda luteola* | Lírio-dos-tintureiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Retama sphaerocarpa* | Piorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rorippa nasturtium-aquaticum* | Agrião | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rorippa sylvestris* | Agrião-silvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rosa blondaeana* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rosa canina* | Roseira-de-cão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rosa micrantha* | Roseira-das-folhas-glandulosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rosa pouzinii* | Roseira-de-pés-glandulosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rosa tomentosa* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rubia peregrina* | Raspa-língua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rubus lainzii* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rubus sampaioanus* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rubus ulmifolius* | Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rumex bucephalophorus* | Catacuzes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rumex conglomeratus* | Labaça-comum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rumex crispus* | Labaça-crespa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rumex induratus* | Azeda-romana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rumex obtusifolius* | Azeda-de-folhas-largas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rumex papillaris* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rumex pulcher* | Labaça-sinuada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ruscus aculeatus* | Gilbardeira | * | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| *Salix alba* | Salgueiro-branco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Salix atrocinerea* | Salgueiro-cinzento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Salix fragilis* | Vimeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Salix salviifolia* | Borrazeira-branca | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Salix viminalis* | Vima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Sambucus ebulus* | Erva-de-São-Cristovão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Sambucus nigra* | Sabugueiro-negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Sanguisorba verrucosa* | Pimpinela-pequena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Saponaria officinalis* | Erva-saboeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Scirpoides holoschoenus* | Bunho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Scolymus hispanicus* | Cangarinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Scrophularia scorodonia* | Trolha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Sedum amplexicaule* | Favária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Sedum arenarium* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Sedum forsterianum* | Arroz-das-paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Sedum hirsutum* | Uva-de-gato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Setaria viridis* | Milhã-de-cabecinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Sherardia arvensis* | Granza-dos-campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Silene gallica* | Nariz-de-zorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Silene inaperta* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Silene latifolia* | Assobios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Silene nutans* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Silene vulgaris* | Orelha-de-boi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Silybum marianum* | Cardo-leiteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Sisymbrium officinale* | Erva-rinchão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Solanum dulcamara* | Doce-amarga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Solanum nigrum* | Erva-moira-negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Sonchus asper* | Serralha-áspera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Sonchus oleraceus* | Serralha-macia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Spergularia purpurea* | Sapinho-roxo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Stellaria graminea* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Stellaria pallida* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Tamarix africana* | Tamargueira-de-rama-preta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Tamarix mascatensis* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Tamus communis* | Uva-de-cão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Teucrium scorodonia* | Salva-bastarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Thalictrum speciosissimum* | Ruibarbo-dos-pobres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Thapsia villosa* | Canavoura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Tolpis barbata* | Olho-de-mocho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Tordylium maximum* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Torilis nodosa* | Salsinha-de-cabeça-rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Torilis purpurea* | Salsinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Torilis recta* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Trifolium angustifolium* | Rabo-de-gato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Trifolium arvense* | Pé-de-lebre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Trifolium campestre* | Trevo-amarelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Trifolium cernuum* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Trifolium dubium* | Trevo-amarelo-menor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Trifolium glomeratum* | Trevo-aglomerado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Trifolium hirtum* | Trevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Trifolium pratense* | Trevo-dos-prados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Trifolium repens* | Trevo-branco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Trifolium resupinatum* | Trevo-de-flores-reviradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Typha domingensis* | Foguetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ulmus minor* | Ulmeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Umbilicus rupestris* | Umbigo-de-vénus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Urginea maritima* | Cebola-do-mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Urtica dioica* | Urtiga-maior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Urtica membranacea* | Urtiga-de-cauda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Urtica urens* | Urtiga-menor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Verbascum pulverulentum* | Cachapeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Verbena officinalis* | Erva-dos-leprosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Veronica anagallis-aquatica* | Morrião-da-água | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Veronica arvensis* | Verónica-dos-campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Vicia angustifolia* | Ervilhaca-dos-trigos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Vicia cordata* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Vicia dasycarpa* | Ervilhaca-cicirão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Vicia disperma* | Ervilhaca-brava-miúda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Vicia lutea* | Ervilhaca-amarela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Vinca difformis* | Congorça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Viola palustris* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Viola riviniana* | Violeta-brava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Vitis vinifera* | Videira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Vulpia geniculata* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Xanthium italicum* | Bardana-menor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Xanthium spinosum* | Pica-três | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |