

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor	
	RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	AHBS/RMQ.13.01

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DE FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011

CONTROLO DE REVISÃO			
Revisão	Data	Capítulo/ Página	Descrição
00	13-01-2012	NA	Versão Original
01	25-01-2012	Capítulos 4.1 e 5.2	Alterações efectuadas segundo considerações emitidas pela comunicação electrónica da Fiscalização de 24 de Janeiro de 2012, com Ref. AHBS/11.2830/0099/12/CEL/ACE/EM

ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
 25/01/2012 RESPONSÁVEL ECOVISÃO	_____/____/____ RESPONSÁVEL AMBIENTAL DA EMPREITADA	_____/____/____ DONO DE OBRA / FISCALIZAÇÃO



	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	---

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO.....	3
1.1 – Objectivos	4
1.2 – Âmbito	4
1.3 – Enquadramento Legal	5
1.4 – Estrutura do relatório	6
1.5 – Autoria Técnica.....	6
2 – ANTECEDENTES.....	7
3 – METODOLOGIA.....	11
3.1 – Parâmetros a registar e locais de amostragem, medição ou registo	11
3.2 – Métodos e equipamentos de recolha de dados	13
3.3 – Métodos de tratamento dos dados	15
3.4 – Relação dos dados com características do projecto ou do ambiente exógeno ao projecto	17
3.5 – Critérios de avaliação dos dados	17
4 – RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO	18
4.1 – Resultados obtidos	18
4.2 – Discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos	60
4.3 – Avaliação da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de monitorização	62
4.4 – Comparação com as previsões efectuadas no EIA	63
5 – CONCLUSÃO.....	64
5.1 – Síntese da avaliação dos impactes objecto de monitorização e da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de monitorização	64
5.2 – Proposta de novas medidas de mitigação e ou de alteração ou desactivação de medidas já adoptadas.....	64
5.3 – Proposta de revisão dos programas de monitorização e da periodicidade dos futuros relatórios de Monitorização	64

ANEXOS

ANEXO I – BIBLIOGRAFIA

ANEXO II – SÍNTESE DAS VARIÁVEIS DIAGNOSTICANTES PARA A IDENTIFICAÇÃO ACÚSTICA DE QUIRÓPTEROS

ANEXO III – TABELAS DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM

ANEXO IV – CARTOGRAFIA

ANEXO V – RESUMO TÉCNICO

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

1 – INTRODUÇÃO

O Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS) localiza-se nas regiões de Trás-os-Montes e Alto Douro, mais precisamente no troço inferior do rio Sabor, sendo este o primeiro afluente da margem direita do rio Douro, em território nacional (EIA, 2004).

O rio Sabor tem a sua nascente na Serra de Parada, em Espanha, a cerca de 1 600 metros de altitude, indo desaguar no rio Douro a jusante de Pocinho, à altitude de 97 metros. Aproximadamente 86% da bacia está situada em território português (RECAPE, 2006).

O AHBS será composto por duas barragens que se localizam no troço inferior do rio Sabor, estando a de montante localizada a cerca de 12,6 km da confluência do rio Sabor com o rio Douro e a de jusante, que cumpre as funções de um contra-embalse, localizada a cerca de 3 km da foz do Rio Sabor. Da sua implantação resulta a criação de duas albufeiras, a albufeira principal que se estende para montante ao longo de cerca de 60 km do curso do rio Sabor e que tem nível de armazenamento (NPA) à cota (234), ocupando áreas dos concelhos de Torre de Moncorvo, Alfândega da Fé, Mogadouro e Macedo de Cavaleiros, e a do contra-embalse, compreendida entre as duas barragens, cujo NPA se encontra à cota (138), ocupando uma área do concelho de Torre de Moncorvo (EIA, 2004; RECAPE, 2006).

A gestão do património natural assenta na monitorização da biodiversidade, aspecto de primordial importância na gestão dos ecossistemas. A fase inicial de monitorização da Biodiversidade consiste na identificação das espécies e comunidades presentes, bem como na sua distribuição espacial. Numa fase posterior é feita uma avaliação do estado de conservação das comunidades animais e vegetais ao longo das fases de construção e de exploração.

O Rio Sabor localiza-se essencialmente no Distrito de Bragança – Nordeste transmontano – sendo caracterizado pela existência de planaltos primitivos, formando um vale escarpado estreito e profundo.

É uma zona muito rica em Biodiversidade, tendo sido, em estudos anteriores, descritas numerosas espécies, entre elas Águia-real (*Aquila chrysaetos*), Águia de Bonelli (*Aquila fasciata*), Abutre do Egito (*Neophron percnopterus*), Falcão-peregrino (*Falco peregrinus*), Bufo-real (*Bubo bubo*), Cegonha-preta (*Ciconia nigra*), Lobo (*Canis lupus*), Lontra (*Lutra lutra*), Toupeira-de-água (*Galemys pyrenaicus*), Sobreiro (*Quercus suber*), Azinheira (*Quercus rotundifolia*) e Buxo (*Buxus sempervirens*).

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	---

1.1 – Objectivos

Este Programa de Monitorização tem como objectivos:

- Determinação de impactos / alterações através do acompanhamento das populações ao longo das diferentes etapas do empreendimento, quer das prospectadas no âmbito do estudo do RECAPE, quer das identificadas nos novos levantamentos;
- A avaliação da eficácia das medidas de minimização e compensatórias a implementar, na conservação das populações de quirópteros da área.

1.2 – Âmbito

O âmbito deste estudo é a realização da campanha de monitorização relativa ao Outono de 2011, realizada durante os meses de Setembro e Outubro de 2011, do descritor Fauna – Quirópteros, para a Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS).

As datas de realização das campanhas e o esforço de amostragem são apresentadas na **Tabela 1.1**.

Tabela 1.1 – Datas da realização das amostragens e esforço de amostragem

CAMPANHA	DATAS DE REALIZAÇÃO DE AMOSTRAGENS	ESFORÇO DE AMOSTRAGEM
Outono de 2011 Abrigos (Fase de Obra)	De 18 a 22 e 27 a 30 de Setembro	2 pessoas/equipa (2 equipas)
	15 de Outubro	2 pessoas/equipa (2 equipas)
Outono de 2011 Acústica (Fase de Obra)	De 5 a 8, 16 a 22 e 27 a 30 de Setembro	2 pessoas/equipa (2 equipas)
	De 12 a 21 e de 25 a 28 de Outubro	2 pessoas/equipa (2 equipas)

No que se refere a limites espaciais o presente relatório cobriu uma área definida como de Influência do AHBS com 62 500 ha, correspondente a 25 quadrículas 5*5 km, definidas durante a Campanha de Referência Pré-Obra.

Como Zona Controlo, foi definida uma área com 30 000 ha acrescida de um conjunto de abrigos cavernícolas fora dos limites da zona controlo. Inicialmente esta zona correspondia a 12 quadrículas 5*5 km a montante da Área de Influência do AHBS, ao longo do Vale do rio Sabor. Devido à falta de abrigos do tipo "Edifícios" foi definida uma nova zona controlo que manteve 5

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

das quadrículas da zona controlo inicial (quadrículas 27, 31, 34, 36 e 37) e definiu 7 novas quadrículas por estarem na proximidade de abrigos (quadrículas 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51). As quatro primeiras localizações no limite Sudeste da Área de Influência do AHBS, a quadrícula 49 na zona das Minas de St.º Adrião a leste da Área de Influência do AHBS e as quadrículas 50 e 51 na zona das Minas da Ribeira, em Coelhooso, a norte da primeira Área Controlo. Nestas quadrículas para além da monitorização de abrigos foram implementados pontos de acústica.

1.3 – Enquadramento Legal

Dado o potencial ecológico existente na zona são de salientar os seguintes diplomas legais referentes à conservação da natureza e diversidade biológica:

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, que procedeu à transposição para a ordem jurídica interna da Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril, relativa à conservação das aves selvagens (directiva aves) e da Directiva 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (Directiva Habitats).

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, que actualiza e reformula alguns do artigos referentes ao Decreto-Lei n.º 140/99.

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, que estabelece o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental.

Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que actualiza e reformula o Decreto-Lei n.º 69/2000.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/2001, de 6 de Junho de 2001, onde se determina a elaboração do plano sectorial relativo à implementação da Rede Natura 2000.

Convenção de Berna (Transposta para a legislação nacional pelo Decreto n.º 95/81, de 23 de Julho).

De acordo com o seu Artigo 1.º, os objectivos da Convenção são conservar a flora e a fauna selvagens e os seus habitats naturais, em particular as espécies e os habitats cuja conservação exija a cooperação de diversos estados, e promover essa cooperação; particular ênfase é atribuída às espécies em perigo ou vulneráveis, incluindo as espécies migratórias.

A Convenção de Berna inclui os seguintes anexos:

Anexo I – Espécies de flora estritamente protegidas;

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor	
	RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	AHBS/RMQ.13.01

Anexo II – Espécies de fauna estritamente protegidas;

Anexo III – Espécies de fauna protegidas.

Convenção CITES (Transposta para a legislação nacional pelo Decreto n.º 50/80, de 23 de Julho).

O objectivo principal da Convenção CITES, também chamada de Convenção de Washington, é assegurar a cooperação entre as Partes, para que o comércio internacional de animais e plantas selvagens não ponha em causa a sua sobrevivência.

Directiva Habitats (Transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril).

A Directiva Habitats (Directiva 92/43/CE) tem como principal objectivo contribuir para assegurar a Biodiversidade através da conservação dos habitats naturais (anexo I) e de espécies da flora e da fauna selvagens (anexo II) considerados ameaçados no território da União Europeia.

1.4 – Estrutura do relatório

O presente relatório de monitorização foi estruturado de acordo com as normas técnicas constantes do Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, com as necessárias adaptações ao caso concreto em apreço.

1.5 – Autoria Técnica

O presente relatório de monitorização foi elaborado pela empresa Ecovisão, Tecnologias do Meio Ambiente, Lda., com sede na Rua Maria da Paz Varzim, 116, 2.º, na Póvoa de Varzim.

A equipa técnica envolvida na monitorização foi composta de técnicos especializados nas várias vertentes necessárias que compõem a presente monitorização e com a experiência necessária à mesma, enunciados na **Tabela 1.2**.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

Tabela 1.2 – Equipa técnica envolvida na monitorização de Quirópteros na Área de Influência do AHBS e Área Controlo durante a campanha de Outono de 2011.

Equipa Técnica		
Coordenação	Paulo Manuel Mota de Oliveira	Biólogo
Trabalho de Campo	Pedro Correia Rodrigues	Biólogo
	Nuno Garrido	Biólogo
	Nuno Pinto	Biólogo
	Virgínia Duro	Bióloga
	Frederico Oliveira	Biólogo
Trabalho de Laboratório	Pedro Correia Rodrigues	Biólogo
	Nuno Garrido	Biólogo
	Nuno Pinto	Biólogo
Elaboração do Relatório	Pedro Correia Rodrigues	Biólogo
	Nuno Garrido	Biólogo
	Nuno Pinto	Biólogo
	José Vítor de Sousa Vingada	Biólogo
	Virgínia Duro	Bióloga
	Frederico Oliveira	Biólogo

2 – ANTECEDENTES

A génese do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS) resulta da Resolução de Conselho de Ministros n.º 4/96, aprovada na sequência da decisão de suspender a construção da barragem de Foz Côa, e definiu como fundamental:

“assegurar o conveniente aproveitamento do potencial hídrico e energético do País, sendo por isso essencial o valor da água a armazenar no Douro Superior e seus afluentes”,

tendo resolvido:

“acelerar os estudos relativos a outros projectos de aproveitamento hídrico e energético do Douro Superior e seus afluentes, com o objectivo de possibilitar a construção de uma barragem que possa cumprir funções hídricas e energéticas semelhantes às atribuídas à barragem de Foz Côa.”

Na sequência daquela decisão governamental, a então CPPE (actual EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A.) promoveu, entre 1996 e 1999, a elaboração do **Estudo Prévio do AHBS** e do respectivo **Estudo de Impacte Ambiental (EIA)**.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	--

Em 2000, a respectiva AIA conclui, face à sensibilidade ecológica da área afectada pelo aproveitamento, pela necessidade de reformular o EIA, de forma a contemplar uma análise comparativa do AHBS com o Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa (AHAC). O EIA de Avaliação Comparada do AHBS e do AHAC foi submetido a novo procedimento de AIA em Fevereiro de 2003.

Este procedimento de AIA terminou em 15 de Julho de 2004 com a emissão, pelo Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, de uma **DIA favorável ao AHBS**, condicionada à elaboração de um conjunto de estudos e de planos, ao cumprimento de medidas de minimização e compensação e à monitorização.

Assim, de acordo com a DIA, “(...) Não tendo sido identificados, em ambas as alternativas avaliadas, impactes negativos que justificassem o abandono liminar das mesmas, a opção pela alternativa Baixo Sabor quando comparada com a alternativa Alto Côa é legitimada, entre outros argumentos constantes do parecer da CA e do parecer da Autoridade de AIA, pelo seguinte:

- das duas alternativas sujeitas à avaliação, o AHBS é o único que contribuirá, em tempo útil, para o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito da produção de energia eléctrica a partir de fontes de energia renováveis e da redução de emissões de gases com efeito de estufa, directamente, e, indirectamente, para a viabilização da expansão do parque eólico;

- a capacidade de controlo dos caudais de ponta em caso de cheia é significativamente maior no caso do AHBS, sendo a capacidade de regularização de caudais também superior para este empreendimento;

- o AHBS garante a preservação do sítio de Arte Rupestre do Vale do Côa, classificado na Lista do Património Mundial da UNESCO, património que levou à inviabilização da construção da barragem de Foz Côa;

- a execução do projecto do AHBS exigirá um investimento significativamente inferior ao do projecto do AHAC, sendo também significativamente inferiores os custos previstos para a produção de energia eléctrica. (...)”

De referir ainda que, segundo a DIA, a “não opção pela alternativa zero assenta na ausência de solução alternativa que cumpra, em tempo útil e eficazmente os objectivos de interesse público, propostos para o projecto, designadamente, a produção de energia eléctrica a partir de Fontes de Energia Renováveis, a garantia de estabilidade do sistema electroprodutor, a redução da dependência energética externa e consequente diminuição da factura energética, a criação de uma reserva estratégica de água e a regularização de caudais no rio Douro.”

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	--

A DIA e o respectivo anexo foram publicados no Diário da República nº 233, II Série, 2-10-2004 (Despacho Conjunto n.º 592/2004).

Com vista a analisar e demonstrar a conformidade do projecto de execução com a respectiva DIA, foi elaborado um RECAPE, de Janeiro de 2006.

O RECAPE foi avaliado pela Comissão de Avaliação nomeada no âmbito do procedimento de AIA (Procedimento n.º 1088), tendo emitido parecer em Dezembro de 2006, onde tece um conjunto de observações e solicitam elementos complementares. Esses elementos correspondem nalguns casos à solicitação de rectificações e noutros à necessidade de se complementarem ou alterarem soluções em particular relacionadas com as medidas de compensação.

Com vista a dar resposta às questões e solicitações feitas pela CA foi feito um aditamento ao RECAPE de Julho de 2007.

Durante a elaboração do aditamento, o programa de medidas compensatórias mereceu especial atenção por parte da Direcção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia que, após visita técnica ao local, em Junho de 2007, solicitou o reforço do pacote de medidas.

Uma vez que não haviam sido incorporadas estas novas medidas no Aditamento, foi elaborada uma Adenda ao Aditamento, datada de Setembro de 2007, que constitui o programa completo das medidas ambientais para o AHBS, no âmbito do qual se integra o Programa de Monitorização da Fauna (incluindo o descritor Quirópteros) e onde está definida a apresentação periódica de Relatórios de Monitorização.

Para o desenvolvimento da campanha de monitorização a que diz respeito o presente relatório, fez-se uso da informação constante nos anteriores relatórios de monitorização:

- ✓ Relatório de Monitorização de Fauna – Campanha de Pré-Obra (Agosto/Setembro de 2008);
- ✓ Relatório de Monitorização de Fauna – Campanha de Outono 2008;
- ✓ Relatório de Monitorização de Fauna – Campanha de Inverno 2009;
- ✓ Relatório de Monitorização de Fauna – Campanha de Primavera 2009;
- ✓ Relatório de Monitorização de Fauna – Campanha de Referência 2008-2009;
- ✓ Relatório de Monitorização de Fauna – Campanha de Verão 2009;
- ✓ Relatório de Monitorização de Fauna – Campanha de Outono 2009;
- ✓ Relatório de Monitorização de Fauna – Campanha de Inverno 2010;
- ✓ Relatório de Monitorização de Fauna – Campanha de Primavera 2010;

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	--

- ✓ Relatório de Monitorização Anual de Fauna 2009-2010;
- ✓ Relatório de Monitorização de Fauna – Campanha de Verão 2010;
- ✓ Relatório de Monitorização de Fauna – Campanha de Outono 2010;
- ✓ Relatório de Monitorização de Fauna – Campanha de Inverno 2011;
- ✓ Relatório de Monitorização de Fauna – Campanha de Primavera 2011;
- ✓ Relatório de Monitorização de Fauna – Campanha de Verão 2011.

De acordo com a informação produzida em fase de RECAPE as medidas previstas para prevenir e/ou reduzir impactes referentes ao descritor Quirópteros são:

- ✓ Desobstrução de entrada de abrigos;
- ✓ Construção de cavidades subterrâneas (minas);
- ✓ Colocação de caixas-abrigo;
- ✓ Limitação do acesso a abrigos importantes para a conservação dos morcegos;
- ✓ Recuperação paisagística e reabilitação de habitats degradados nomeadamente de galerias ripícolas e de áreas de bosque autóctone;
- ✓ Elaboração e implementação do Programa de Monitorização de Quirópteros.

As principais **medidas de minimização gerais** que de alguma forma influenciam o descritor Quirópteros dizem respeito aos seguintes aspectos:

- Programas de conservação do buxo, de peixes não migradores, de aves rupícolas, da toupeira-de-água, do lobo, da lontra e dos morcegos;
- Integração e recuperação paisagística das zonas ocupadas e afectadas pelas obras;
- Gestão ambiental das obras.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	--

3 – METODOLOGIA

3.1 – Parâmetros a registar e locais de amostragem, medição ou registo

Durante a campanha à qual o presente relatório se refere pretendeu-se efectuar as seguintes acções:

- i) o inventário de espécies de morcegos;
- ii) o inventário de abrigos;
- iii) a localização dos habitats de alimentação;
- iv) caracterização das variáveis ambientais (tipo de biótopo) que determinam a presença das diversas espécies de morcegos e identificam a importância do biótopo (alimentação).

De seguida apresenta-se a tabela onde se descrevem os parâmetros a registar.

Tabela 3.1 – Parâmetros a monitorizar – Quirópteros

Parâmetros a Monitorizar	Abreviatura	Impacte	Quantificação	Método de amostragem	N.º de locais de amostragem	Frequência de amostragem
ABRIGOS						
Presença de Abrigo	PreAbr	-	N.º de abrigos na Área de Influência do AHBS	Busca em estruturas favoráveis	Abrigos já identificados e potenciais na Área de Influência do AHBS e na Área Controlo	Trimestral
Número de espécies em Abrigos	NumEspAbr	-	N.º de espécies presentes por abrigo, na Área de Influência do AHBS	Identificação de indivíduos nos abrigos	Abrigos já identificados e potenciais na Área de Influência do AHBS e na Área Controlo	Trimestral
Número de indivíduos em Abrigos	NumIndAbr	-	N.º de indivíduos por abrigo, na Área de Influência do AHBS	Contagem de indivíduos nos abrigos	Abrigos já identificados e potenciais na Área de Influência do AHBS e na Área Controlo	Trimestral
DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES						
Número de espécies	NumEsp	-	N.º de espécies presentes por ponto	Pontos de amostragem	2 pontos por quadrícula definida no Relatório de Referência Anual e quadrículas na Área Controlo	Mensal de Março a Outubro
Presença de espécies	PreEsp	-	Número de pontos com presença positiva por espécie	Pontos de amostragem	2 pontos por quadrícula definida no Relatório de Referência Anual e quadrículas na Área Controlo	Mensal de Março a Outubro

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	--

Tabela 3.1 – Parâmetros a monitorizar – Quirópteros (cont.)

Parâmetros a Monitorizar	Abreviatura	Impacte	Quantificação	Método de amostragem	N.º de locais de amostragem	Frequência de amostragem
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO						
Presença nos novos Abrigos e caixas	PreNovosAbr	+	N.º de novos abrigos/caixas ocupados	Busca em novos abrigos/caixas	Novos abrigos/caixas a criar	Trimestral
Número de espécies em novos Abrigos e caixas	NumEspNovosAbr	+	N.º de espécies presentes por novos Abrigos e caixas, na Área de Influência do AHBS	Identificação e contagem de indivíduos nos novos abrigos/caixas	Novos abrigos/caixas a criar	Trimestral
Número de indivíduos em novos Abrigos e caixas	NumIndNovosAbr	+	N.º de indivíduos por novos Abrigos e caixas, na Área de Influência do AHBS	Identificação e contagem de indivíduos nos novos abrigos/caixas	Novos abrigos/caixas a criar	Trimestral
DISPONIBILIDADE DE HABITAT						
Habitat de alimentação	habitatAli	-	N.º de feeding buzzes por ponto de acústica	Pontos de amostragem	2 pontos por quadrícula definida no Relatório de Referência Anual e quadrículas na Área Controlo	Mensal de Março a Outubro
Habitat potencial para espécie	habitatSpi	-	Área de habitat potencial para espécie <i>i</i> na Área de Influência do AHBS e na Área Controlo	Cartografia e modelação	2 pontos por quadrícula definida no Relatório de Referência Anual e quadrículas na Área Controlo	Anual

A coluna referente aos impactos diz respeito ao impacto que se espera que a construção e exploração do Aproveitamento Hidroeléctrico tenha no valor de cada parâmetro (- se o valor diminuir, + se o valor aumentar).

A monitorização de abrigos foi realizada na Área de Influência do AHBS, que se considerou ser a área a ficar submersa após o total enchimento das zonas de albufeira e zonas adjacentes à futura albufeira que possam ser directamente influenciadas (considerou-se como zona adjacente a área contida num *buffer* de 5km relativamente os limites das cotas de enchimento). Pontualmente, foram inspeccionados locais fora desta zona que devido à sua relativa proximidade em relação à área de influência e ao facto de apresentarem boas condições para potencialmente serem abrigos de quirópteros, poderiam ser relevantes neste estudo. A localização dos abrigos de quirópteros a prospectar encontra-se na **Tabela 1 do Anexo III**.

Tendo em conta que na fase de RECAPE foi realizado um estudo de caracterização da situação dos quirópteros na área de implantação do AHBS (Ribeiro *et al.* 2005), os trabalhos de

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

prospecção de abrigos incidiram com maior atenção nos abrigos anteriormente identificados como ocupados. Para além destes, foram prospectados novos locais que apresentavam condições favoráveis à sua utilização por parte de espécies de morcegos, como sendo edifícios abandonados, pontes, açudes, pequenas grutas e antigas minas de água ou de extracção de minério. Este tipo de estruturas é utilizado por espécies cavernícolas, sendo os indivíduos geralmente detectados através de observação directa. Contudo, para as espécies fissurícolas e arborícolas este tipo de abordagem não é muito eficaz, uma vez que na área de estudo a disponibilidade de locais adequados para serem utilizados como abrigos é grande, o que torna a probabilidade de detecção de abrigos uma tarefa difícil. No entanto, foram inspeccionadas pontualmente árvores de grande porte com cavidades e algumas fissuras em afloramentos rochosos acessíveis e com alguma potencialidade.

No que se refere à detecção acústica, a selecção dos locais baseou-se no tipo de habitat dominante existente na quadrícula, bem como na procura de locais adequados em termos de exposição ao vento, proximidade a linhas ou pontos de água, afastamento de agregados humanos e de fontes de ruído, permitindo uma cobertura adequada de habitats de alimentação, bem como de diferentes habitats propícios à ocorrência das diversas espécies de quirópteros. A localização dos pontos de amostragem é apresentada na **Tabela 2 do Anexo III**.

3.2 – Métodos e equipamentos de recolha de dados

Criação da base cartográfica de trabalho

Foi construída uma grelha de quadrículas UTM 1x1 km sobre a área ocupada pelas albufeiras do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor, que serve de base para cartografar os locais de amostragem e a distribuição da espécie, recorrendo a um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Contudo, de modo a harmonizar os dados desta campanha com estudos anteriores, a apresentação dos dados no relatório da campanha é efectuada com uma projecção em quadrícula de 5x5 km (ver **Figura 3.1**). As observações realizadas no trabalho de campo foram georreferenciadas com o auxílio de um GPS e posteriormente integradas numa base de dados em ambiente SIG. Nesta base foram também inseridos os dados da bibliografia compilada incluindo os dados do trabalho de caracterização anteriores.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	---




Figura 3.1 – Mapa da Área de Influência do AHBS e Área Controlo subdivididas em quadrículas de 5x5 km (a rosa encontram-se as quadrículas controlo inicialmente monitorizadas, mas que foram substituídas posteriormente).

Monitorização de abrigos

A inspecção e prospecção de abrigos foram realizadas durante o período diurno recorrendo a focos e frontais de luz branca e fria, com a possibilidade de serem substituídos por luz vermelha (de forma a diminuir a perturbação sobre os animais). A deslocação ao longo dos abrigos é efectuada lentamente de modo a permitir a procura de animais nas paredes, tecto e cavidades dos abrigos. Sempre que detectados animais procedeu-se à sua identificação, contagem e se possível registo fotográfico.

Em cada abrigo foi também inspeccionada a presença de vestígios (guano, cadáveres, etc).

Deteção acústica de ultra-sons

O estudo da utilização do espaço por quirópteros foi realizado através da deteção acústica. Esta metodologia permite detectar actividade e identificar as espécies de morcegos presentes na área de estudo.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

O equipamento utilizado (Pettersen 240x[®]) encontra-se equipado com 2 sistemas de detecção: o heterodino e o tempo expandido. O sistema de heterodino converte o ultra-som para a gama do audível e permite ouvir a vocalização do morcego em tempo real. Com o auxílio de um visor que indica a frequência da vocalização é possível ter uma ideia imediata das espécies prováveis, permitindo também identificar a passagem de morcegos no imediato. Importa, no entanto, realçar que esta metodologia não permite uma contabilização do número exacto de indivíduos presentes.

O segundo sistema, tempo expandido, retarda o som (neste caso 10x). Utilizando um gravador adequado é possível efectuar um registo deste som retardado e realizar uma análise com software apropriado. Com base nas variáveis que diagnosticam as vocalizações, é possível identificar a espécie em causa. Contudo, importa salientar que esta análise nem sempre é conclusiva, não sendo sempre possível identificar com certeza absoluta a espécie em causa, devendo sempre, nesses casos, ser referida a hipótese de estarmos na presença de outra espécie menos comum cuja diferenciação é impossível ou, noutros casos, ser indicado o grupo de espécies cuja semelhança entre vocalizações impossibilita a sua distinção.

Em termos de desenho experimental, a metodologia a adoptar consistiu na amostragem, durante 10 minutos em cada ponto, num total de 97 pontos de amostragem distribuídos em 50 pontos na Área de Influência do AHBS, 26 pontos na Área Controlo e 21 pontos adicionais correspondentes a Açudes existentes ou a recuperar na área de estudo. Os censos foram iniciados meia hora após o pôr-do-sol e terminados 2/3 horas depois (Rainho et al. 1998).

3.3 – Métodos de tratamento dos dados

Monitorização de abrigos

No que se refere à prospecção de abrigos, a informação recolhida foi organizada num Sistema de Informação Geográfica, de forma a permitir a visualização espacial dos dados sobre cartografia adequada, bem como o posterior relacionamento com outras variáveis.

A análise dos dados da monitorização dos abrigos para épocas de Outono de 2008, 2009, 2010 e 2011 foi realizada, para cada abrigo, tendo em conta o total de indivíduos registado e o número de indivíduos de cada espécie.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

Tendo em conta o facto de os Abrigos de Importância Nacional concentrarem números de animais com ordens de grandeza completamente distintas das verificadas na maioria dos abrigos monitorizados, considerou-se mais correcto não considerar os dados destes abrigos na análise estatística. Importa, contudo, salientar que, numa análise exploratória inicial, a sua inclusão foi testada.

Considerando o facto de, para a grande maioria das espécies observadas, o número de indivíduos por abrigo registado ser usualmente muito reduzido (exceptuando o caso dos já referidos Abrigos de Importância Nacional), considerou-se que apenas seria correcto apresentar os resultados da análise estatística para o total de indivíduos por abrigo. Para as espécies ou complexos, a análise estatística trimestral apresenta problemas relacionados com o facto de, independentemente da abundância, o número de abrigos ocupados ser geralmente reduzido, o que se traduz num excesso de valores zero.

De igual modo, comparou-se os dados de ocupação de abrigos em função da área de localização (área inundável, área não inundável e controlo) para a época de Outono de 2011.

Para efeitos de análise estatística, primeiramente, para cada conjunto de dados, foi testada a normalidade com recurso ao teste de Kolmogorov-Smirnov.

Como todos os dados analisados não apresentam distribuições normais optou-se pela aplicação do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido de um post-hoc de Dunns, para comparar os dados relativos às 4 épocas de Outono (2008, 2009, 2010 e 2011) e para a comparação da ocupação de abrigos em função da sua localização espacial.

Os testes estatísticos foram realizados usando o programa Graphpad Prism 3.0, versão 4.0a, sendo que o nível de significância utilizado para todos os testes foi de $P < 0,05$.

Deteção acústica de ultra-sons

No que se refere à análise acústica as gravações foram efectuadas usando um gravador digital com uma taxa de amostragem de 44,2 kHz, sendo posteriormente exportados para ficheiros WAVE (extensão.wav). A análise dos registos sonoros dos morcegos foi efectuada com recurso ao programa de análise de sons BatSound Pro (Pettersson Elektronik AB®). Este programa gera gráficos (oscilograma, sonograma e espectros de potencia) onde são medidas as diversas variáveis sonoras que possibilitam a identificação das espécies ou complexos de espécies

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

detectados. No **Anexo II** são sintetizadas as características diagnosticantes das vocalizações consideradas para diferenciar as diversas espécies / grupos de espécies referenciados.

Relativamente ao tratamento estatístico dos dados de detecção acústica, optou-se pelo teste de chi-quadrado para efectuar uma comparação entre a ocorrência da espécie / complexo entre épocas homólogas (Outono 2009, 2010 e 2011). Para efeitos análise estatística, e tendo em conta os pressupostos de aplicação do teste, apenas se consideraram conjuntos de dados das 4 espécies / complexos de espécies consideradas como localmente mais comuns: *Eptesicus serotinus* / *Eptesicus isabellinus*, *Tadarida teniotis*, *Pipistrellus kuhli* e *Pipistrellus pipistrellus* / *Pipistrellus pygmaeus* / *Miniopterus schreibersii*.

Os testes estatísticos foram realizados usando o programa Graphpad Prism 3.0, versão 4.0a, sendo que o nível de significância utilizado para todos os testes foi de $P < 0,05$.

3.4 – Relação dos dados com características do projecto ou do ambiente exógeno ao projecto

Nesta fase serão avaliados e analisados os impactes directos tendo em vista as medidas de minimização e compensação desses mesmos impactes.

3.5 – Critérios de avaliação dos dados

Os resultados serão confrontados com dados anteriores, quer nos estudos de caracterização efectuados no âmbito do EIA e do RECAPE, quer nas informações bibliográficas e do ICNB, de modo a avaliar a evolução da densidade das populações locais, a sua distribuição e adaptação às novas condições. A análise estatística e cartográfica dos dados permitirá uma avaliação da evolução espacial e temporal dos dados recolhidos. Estas análises serão efectuadas de forma mais detalhada nos Relatórios Anuais que incluirá os dados do próximo ciclo anual, que serão comparados com os dados dos ciclos anuais anteriores.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor	
	RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	AHBS/RMQ.13.01

4 – RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO

4.1 – Resultados obtidos

Monitorização de abrigos

Através da prospecção e inspecção de abrigos foi possível identificar a presença de 7 a 9 espécies/complexos de espécies em 19 abrigos na Área de Influência do AHBS e 6 a 12 espécies/complexos de espécies em 17 abrigos na Área Controlo. Em alguns casos, não foi possível identificar a espécie observada, optando-se apenas por registar o número de indivíduos contabilizados, indicando sempre que possível o género em causa ou, caso tal não fosse possível, classificando a espécie como “Não Identificada”.

A informação relativa ao número de indivíduos observados por espécie, registada em cada abrigo é apresentada na **Tabela 4.1**. Nesta tabela é ainda apresentada a tipologia de abrigo, bem como a sua localização na Área de Influência do AHBS (subdividida em Área Não Inundável ou Área Inundável) ou na Área Controlo. Para cada abrigo é ainda apresentada simbolicamente a tendência no número total de indivíduos, comparativamente com a época homóloga do ano anterior. A localização geral de cada abrigo em relação às Áreas de Influência do AHBS e Controlo, bem como as classes do número total de indivíduos registados, são apresentadas na **Figura 4.1**.




Figura 4.1 – Localização geral de todos os abrigos monitorizados nas Áreas de Influência do AHBS e Controlo. Para cada abrigo é apresentado o número de indivíduos registado, sob a forma classes.

A percentagem de ocupação de abrigos referenciados na Área de Influência do AHBS foi de 44% (19 ocupados em 43 abrigos potenciais prospectados). Excluindo os abrigos de importância nacional (M35, M36, M37 e M67), os abrigos com maior número total de animais foram o M62 – Mina Qt.^a da Laranjeira, onde foram observados 63 indivíduos do género *Rhinolophus* e M68 – Mina de Reboredo com cerca de 80 indivíduos do género *Rhinolophus* e 20 indivíduos não identificados. De destacar ainda os registos nos Abrigos de Importância Nacional M35, M36, M37 e M67.

A percentagem de ocupação de abrigos referenciados para a Área Controlo foi de 46% (17 ocupados em 37 abrigos potenciais). De destacar o registo no abrigo MC28 de aproximadamente 30 indivíduos, bem como no abrigo MC30 de 70 indivíduos. De salientar, também, no abrigo MC14 das Minas de St.^o Adrião, o registo de 38 *Myotis myotis / blythii*, 182 *M. schreibersii* e 3 *Rhinolophus euryale/mehelyi*.

Para os abrigos que foram monitorizados na época homóloga do ano anterior, para os quais é possível estabelecer uma comparação entre anos, indicou-se simbolicamente na **Tabela 4.1** qual a tendência de ocupação (aumento, diminuição ou igual número total de indivíduos registados). Verificou-se que, para a Área de Influência do AHBS, 9% destes abrigos apresentaram uma

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

tendência positiva, 34% uma tendência negativa e em 57% não existiu variação no número de indivíduos, salientando-se que nestes, em nenhum foi verificada ocupação por parte de morcegos no Outono de 2011 (n=35). Para a Área Controlo, verificou-se que 38% destes abrigos apresentaram uma tendência positiva, 28% uma tendência negativa e em 34% não se verificou nenhuma alteração entre as épocas homólogas (n=29).

Tabela 4.1 – Identificação, caracterização e localização dos abrigos prospectados e identificação das espécies ou complexos de espécies registadas durante a campanha de Outono de 2011

Abrigo	Código	Tipo de Abrigo	Área	Espécies	N.º Ind.	Tendência	Observações	Data
Casa Ponte de Remondes	M01	Edifícios abandonados	Área Inundável	-	-	=		15-10-2011
Casa estrada Remondes – Mogadouro	M02	Edifício abandonado	Área Não Inundável	-	-	=		15-10-2011
Qt.ª St.º André II	M03	Edifício abandonado	Área Não Inundável	<i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	5 2	↓	Alguns indivíduos voadores	28-09-2011
Qt.ª da Roca	M05	Edifícios	Área Não Inundável	<i>Rhinolophus euryale/mehelyi</i>	2	↓		28-09-2011
Qt.ª Laranjeira	M18	Edifícios abandonados	Área Inundável	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	1	↓		18-09-2011
Vale de Felgar	M19	Mina de Água	Área Não Inundável	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus euryale/mehelyi</i> <i>Myotis myotis/ blythii</i>	4 8 1	↓	Alguns indivíduos voadores	28-09-2011
Qt.ª Crestelos	M23	Edifícios abandonados	Área Inundável	-	-	=		28-09-2011
Qt.ª S. Gonçalo	M24	Edifícios	Área Inundável	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	3	↓	Alguns indivíduos voadores	28-09-2011
Qt.ª Branca	M25	Edifícios	Área Inundável	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	1	↓		28-09-2011
Qt.ª do Azinhal	M30	Edifícios	Área Não Inundável	-	-	↓		15-10-2011
Qt.ª da Barca	M31	Edifício + gruta	Área Não Inundável	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	10	↑	Alguns indivíduos voadores	19-09-2011
Qt.ª St.ª Marinha	M32	Edifícios	Área Não Inundável	<i>Rhinolophus euryale/mehelyi</i>	4	↑	Alguns indivíduos voadores	19-09-2011
Mina de Estevais	M34	Mina de água	Área Não Inundável	-	-	=		28-09-2011

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

Tabela 4.1 – Identificação, caracterização e localização dos abrigos prospectados e identificação das espécies ou complexos de espécies registadas durante a campanha de Outono de 2011 (cont.)

Abrigo	Código	Tipo de Abrigo	Área	Espécies	N.º Ind.	Tendência	Observações	Data
Ferrominas	M35	Mina	Área Não Inundável	<i>Rhinolophus sp.</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus euryale/mehelyi</i> <i>Miniopterus schreibersii</i> NI	9 2 1 1 4 16	↓	Alguns indivíduos voadores	30-09-2011
Monte da Mua	M36	Mina	Área Não Inundável	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus euryale/mehelyi</i> <i>Miniopterus schreibersii</i> NI	3 9 32 8	↓	Alguns indivíduos voadores	30-09-2011
Minas de Carviçais	M37	Mina	Área Não Inundável	<i>Rhinolophus sp.</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Rhinolophus euryale/mehelyi</i> <i>Plecotus sp</i> <i>Myotis myotis/ blythii</i> <i>Miniopterus schreibersii</i> NI	3 1 76 1 4 109 40	↓	Alguns indivíduos voadores	29-09-2011
Casa passagem escalo montante	M38	Edifícios	Área Inundável	-	-	=		28-09-2011
Souto da Velha	M39	Edifícios	Área Não Inundável	-	-	=		18-09-2011
Abrigo Construído (Escalão Montante)	M40	Galeria	Área Não Inundável	<i>Rhinolophus sp.</i>	2	↑	Alguns indivíduos voadores	20-09-2011
Casas Vale Felgar I	M46	Edifícios	Área Não Inundável	-	-	↓		28-09-2011
Casas Vale Felgar II	M47	Edifícios	Área Inundável	-	-	=		28-09-2011
Casas Vale Felgar III	M48	Edifícios	Área Inundável	-	-	=		28-09-2011
Qt.ª das Amoreiras	M49	Edifícios	Área Não Inundável	-	-	=		28-09-2011
Qt.ª do Cabeço	M50	Edifícios	Área Não Inundável	-	-	=		28-09-2011
Portela	M51	Edifícios	Área Não Inundável	-	-	=		28-09-2011
Qt.ª Casaleta Jardim	M52	Edifícios	Área Não Inundável	-	-	=		28-09-2011

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

Tabela 4.1 – Identificação, caracterização e localização dos abrigos prospectados e identificação das espécies ou complexos de espécies registadas durante a campanha de Outono de 2011 (cont.)

Abrigo	Código	Tipo de Abrigo	Área	Espécies	N.º Ind.	Tendência	Observações	Data
Qt.ª de St.º André I	M53	Edifícios	Área Não Inundável	-	-	↓		28-09-2011
Casa estrada Souto (St.º André)	M54	Edifícios	Área Não Inundável	-	-	=		28-09-2011
Redil estradão Qt.ª Azinhal / Ponte Remondes	M55	Edifícios	Área Não Inundável	-	-	=	Parte do telhado derrocado	15-10-2011
Casa escalão de montante II	M56	Edifícios	Área Inundável	-	-	=		28-09-2011
Anexo escalão montante	M57	Edifícios	Área Inundável	-	-	=		28-09-2011
Redil montante Cilhade I	M58	Edifícios	Área Inundável	-	-	=	Parte do telhado derrocado	28-09-2011
Redil montante Cilhade II	M59	Edifícios	Área Inundável	-	-	=	Fechado	28-09-2011
Qt.ª da Ponte	M60	Edifícios	Área Inundável	-	-	=		28-09-2011
Redil estradão Talhas / Qt.ª Barca	M61	Edifícios	Área Inundável	-	-	=		19-09-2011
Mina Qt.ª das Laranjeiras	M62	Mina	Área Não Inundável	<i>Rhinolophus sp.</i>	63		Alguns indivíduos voadores	18-09-2011
Monte da Mua – pedra I	M63	Mina	Área Não Inundável	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus euryale/mehelyi</i>	1 8		Alguns indivíduos voadores	30-09-2011
Monte da Mua – pedra II	M64	Mina	Área Não Inundável	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus euryale/mehelyi</i>	2 7		Alguns indivíduos voadores	30-09-2011
Covas – Sendim da Serra	M65	Mina	Área Não Inundável	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus euryale/mehelyi</i>	2 5		Alguns indivíduos voadores. Presença de grandes quantidades de guano.	30-09-2011
Vinha da Mina – Souto	M66	Mina	Área Não Inundável	-	-			29-09-2011
Torre Igreja – Torre de Moncorvo	M67	Edifício	Área Não Inundável	<i>Tadarida teniotis</i>	3			18-09-2011
Mina de Reboredo	M68	Mina	Área Não Inundável	<i>Rhinolophus sp.</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus euryale/mehelyi</i> NI	40 1 40 20		Alguns indivíduos voadores	30-09-2011
Eira do Velho – Carviçais	M69	Mina	Área Não Inundável	<i>Rhinolophus sp.</i> <i>Plecotus sp</i>	2 1		Alguns indivíduos voadores	29-09-2011

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

Tabela 4.1 – Identificação, caracterização e localização dos abrigos prospectados e identificação das espécies ou complexos de espécies registadas durante a campanha de Outono de 2011 (cont.)

Abrigo	Código	Tipo de Abrigo	Área	Espécies	N.º Ind.	Tendência	Observações	Data
Talhas	MC1	Edifícios	Área Controlo	-	-	=		22-09-2011
Macedo do Mato	MC2	Edifícios	Área Controlo	-	-	=	Fechado	22-09-2011
Serapicos	MC3	Edifícios	Área Controlo	-	-	=		22-09-2011
Minas Cristalhão – Coelho galeria 1	MC4	Mina	Área Controlo	<i>Rhinolophus euryale/mehelyi</i> NI	5 1	↑	Presença de guano	22-09-2011
Minas Cristalhão – Coelho galeria 2	MC5	Mina	Área Controlo	-	-	=		22-09-2011
Minas Lombo do Sio – Coelho galeria 3	MC6	Mina	Área Controlo	-	-	=		22-09-2011
Minas Lombo do Sio – Coelho galeria 4	MC7	Mina	Área Controlo	NI	2	↑		22-09-2011
Minas Lombo do Sio – Coelho galeria 5	MC8	Mina	Área Controlo	-	-	↓		22-09-2011
Minas do Coelho - galeria 6	MC9	Mina	Área Controlo	NI	1	↑		22-09-2011
Minas Lombo do Sio – Coelho galeria 7	MC10	Mina	Área Controlo	-	-	↓		22-09-2011
Minas da Ribeira – Coelho Edifício 1	MC11	Edifício	Área Controlo	<i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Myotis spp pequenos</i>	1 1	↑	Indivíduos voadores	22-09-2011
Minas da Ribeira – Coelho Edifício 2	MC12	Edifício	Área Controlo	<i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Myotis spp pequenos</i>	1 1	↑	Indivíduos voadores	22-09-2011
Carção	MC13	Mina	Área Controlo	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	1	↑		29-09-2011
Minas de St.º Adrião – Galeria 1	MC14	Mina	Área Controlo	<i>Rhinolophus euryale/mehelyi</i> <i>Myotis myotis/ blythii</i> <i>Miniopterus schreibersii</i>	3 38 182	↑	Alguns indivíduos voadores	29-09-2011
Minas de St.º Adrião – Galeria 2	MC15	Mina	Área Controlo	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus euryale/mehelyi</i> <i>Myotis myotis/ blythii</i>	4 1 7	↑	Alguns indivíduos voadores	29-09-2011
Minas de St.º Adrião – Galeria 3	MC16	Mina	Área Controlo	-	-	=		29-09-2011

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

Tabela 4.1 – Identificação, caracterização e localização dos abrigos prospectados e identificação das espécies ou complexos de espécies registadas durante a campanha de Outono de 2011 (cont.)

Abrigo	Código	Tipo de Abrigo	Área	Espécies	N.º Ind.	Tendência	Observações	Data
Minas de St.º Adrião – Galeria 4	MC17	Mina	Área Controlo	-	-	=	Sem acesso	29-09-2011
Minas de St.º Adrião – Edifício 1	MC18	Edifício	Área Controlo	-	-	=		29-09-2011
Minas de St.º Adrião – Edifício 2	MC19	Edifícios	Área Controlo	<i>Myotis spp pequenos</i>	2	↑	Indivíduos voadores	29-09-2011
Minas de St.º Adrião – Edifício 3	MC20	Edifícios	Área Controlo	-	-	↓		29-09-2011
Minas Lombo do Sio – Coelhooso Galeria 8	MC21	Mina	Área Controlo	-	-	↓		22-09-2011
Minas de St.º Adrião (Gruta do dique 1)	MC22	Mina	Área Controlo	<i>Rhinolophus sp.</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	3 1	↓	O ICNB considera MC22 e MC23 como 1 abrigo. Alguns indivíduos voadores	29-09-2011
Minas de St.º Adrião (Gruta do dique 2)	MC23	Mina	Área Controlo	<i>Rhinolophus sp.</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	10 2	↑	O ICNB considera MC22 e MC23 como 1 abrigo único. Alguns indivíduos voadores	29-09-2011
Minas de St.º Adrião (Gruta grande – rio)	MC24	Mina	Área Controlo	-	-	↓		29-09-2011
Minas da Ribeira – Coelhooso (galeria pequena Chave)	MC25	Mina	Área Controlo	-	-			22-09-2011
Minas da Ribeira – Coelhooso (galeria grande Chave)	MC26	Mina	Área Controlo	-	-		Mina com bastante potencial; andares superiores não prospectados devido a falta de segurança	22-09-2011
Mina da Gralheira – ribeira Maças	MC27	Mina	Área Controlo	<i>Rhinolophus euryale/mehelyi</i>	3		Indivíduos voadores	29-09-2011
Ferronho – Mós	MC28	Mina	Área Controlo	<i>Rhinolophus sp.</i> <i>Miniopterus schreibersii</i> NI	2 1 28		Indivíduos voadores	19-09-2011
Vinha da Quelhinha – Coelhooso/Parada	MC29	Mina	Área Controlo	NI	1			22-09-2011
Mina de água – Campo de Víboras	MC30	Mina de água	Área Controlo	<i>Myotis myotis/ blythii</i> <i>Miniopterus schreibersii</i> NI	3 2 68		Alguns indivíduos voadores	29-09-2011

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor	
	RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	AHBS/RMQ.13.01

Tabela 4.1 – Identificação, caracterização e localização dos abrigos prospectados e identificação das espécies ou complexos de espécies registadas durante a campanha de Outono de 2011 (cont.)

Abrigo	Código	Tipo de Abrigo	Área	Espécies	N.º Ind.	Tendência	Observações	Data
Olgas – Castelo Branco	MC31	Mina	Área Controlo	-	-			29-09-2011
Minas de Stº Adrião (entrada peq)	MC32	Mina	Área Controlo	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	1			29-09-2011
Qt.ª dos Vicentes	MC33	Edifícios	Área Controlo	-	-	↓		19-09-2011
Qt.ª dos Marcos	MC34	Edifícios	Área Controlo	-	-	=		19-09-2011
Qt.ª Rego do Vale	MC35	Edifícios	Área Controlo	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	1	↑		19-09-2011
Qt.ª de Colmeias	MC36	Edifícios	Área Controlo	-	-	=		19-09-2011
Qt.ª da Fonte Santa	MC37	Edifícios	Área Controlo	-	-	↓		19-09-2011

- ↑ - aumento no número de indivíduos;
 ↓ - diminuição no número de indivíduos;
 = - ausência de variação no número de indivíduos registados entre épocas homólogas consecutivas.

Rhinolophus hipposideros (Vulnerável)

Na Área de Influência do AHBS, as prospecções permitiram confirmar a ocupação de 7 abrigos por indivíduos da espécie *R. hipposideros*, dos quais 5 são edifícios rurais e 2 são cavernícolas (ambos Abrigos de Importância Nacional) (ver **Tabela 4.1** e **Figura 4.2**).

Na Área Controlo, as prospecções permitiram confirmar a ocupação de 4 abrigos. Dos abrigos onde a espécie foi observada (ver **Tabela 4.1** e **Figura 4.2**), 3 são edifícios rurais e 1 é do tipo cavernícola.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	---




Figura 4.2 – Abrigos onde se registou ocupação por morcegos da espécie *Rhinolophus hipposideros* durante a campanha de Outono de 2011.

***Rhinolophus ferrumequinum* (Vulnerável)**

Na Área de Influência do AHBS, as prospekções permitiram confirmar a ocupação de 8 abrigos por indivíduos da espécie *R. ferrumequinum*. Dos abrigos onde a espécie foi observada, 1 é do tipo edifício rural e 7 são do tipo cavernícola, de entre os quais 2 são classificados como Abrigo de Importância Nacional (ver **Tabela 4.1** e **Figura 4.3**).

Na Área Controlo, as prospekções permitiram confirmar a ocupação de 4 abrigos, todos do tipo cavernícola, dois deles classificados como Abrigo de Importância Nacional (ver **Tabela 4.1** e **Figura 4.3**).

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--




Figura 4.3 – Abrigos onde se registou ocupação por morcegos da espécie *Rhinolophus ferrumequinum* durante a campanha de Outono de 2011.

Rhinolophus euryale* / *R. mehelyi (Criticamente em Perigo / Criticamente em Perigo)

Na Área de Influência do AHBS, as prospeções permitiram confirmar a ocupação de 10 abrigos por indivíduos do complexo de espécies *R. euryale* / *R. mehelyi*, dos quais 8 são do tipo cavernícola (3 dos quais classificados como Abrigo de Importância Nacional) e 2 do tipo edifício rural (ver **Tabela 4.1** e **Figura 4.4**).

Na Área Controlo foi possível confirmar a ocupação de 4 abrigos, todos do tipo cavernícola, um dos quais classificado como Abrigo de Importância Nacional (ver **Tabela 4.1** e **Figura 4.4**).

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	---




Figura 4.4 – Abrigos onde se registou ocupação por morcegos do complexo de espécies *Rhinolophus euryale* / *Rhinolophus mehelyi* durante a campanha de Outono de 2011.

***Rhinolophus* sp.**

Neste grupo são incluídos indivíduos do género *Rhinolophus* para os quais não foi possível determinar com certeza a espécie a que pertencem (*R. ferrumequinum* ou *R. euryale* ou *R. mehelyi*). Tal como já foi referido, esta impossibilidade poderá ter decorrido de duas razões: o facto de os animais em causa se terem deslocado para outro local, tendo apenas sido possível registar o género em causa; pelo facto da identificação da espécie requerer uma aproximação aos animais, o que se considerou que poderia constituir uma forte perturbação, em especial se se considerar o número relativamente elevado de animais presentes nos abrigos de importância nacional e a época fenológica em causa. Assim, neste último caso, optou-se apenas por contabilizar o total de indivíduos pertencentes a este género, reduzindo assim o período de permanência no local e a necessidade de aproximação aos animais, por forma a minimizar a perturbação decorrente da monitorização.

Na Área de Influência do AHBS foi registada a presença de indivíduos deste complexo de espécies em 6 abrigos, todos do tipo cavernícola, de entre os quais 2 classificados como Abrigo de Importância Nacional (ver **Tabela 4.1** e **Figura 4.5**).

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	---

Na Área Controlo, a presença de *Rhinolophus sp.* foi detectada em 3 abrigos, todos do tipo cavernícola, de entre os quais 2 classificados como Abrigo de Importância Nacional (ver **Tabela 4.1 e Figura 4.5**).




Figura 4.5 – Abrigos onde se registou ocupação por morcegos do complexo de espécies *Rhinolophus sp.* durante a campanha de Outono de 2011.

***Myotis myotis* / *M. blythii* (Vulnerável / Criticamente em Perigo)**

Na Área de Influência do AHBS foi registada a presença de indivíduos deste complexo de espécies em 2 abrigos, do tipo cavernícola, sendo 1 deles classificado como Abrigo de Importância Nacional (ver **Tabela 4.1 e Figura 4.6**).

Na Área Controlo, a presença de *Myotis myotis* / *Myotis blythii* foi detectada em 3 abrigos, do tipo cavernícola, sendo que 1 deles é um Abrigo de Importância Nacional (ver **Tabela 4.1 e Figura 4.6**).

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	--




Figura 4.6 – Abrigos onde se registou ocupação por morcegos do complexo de espécies *Myotis myotis* / *Myotis blythii* durante a campanha de Outono de 2011.

***Myotis spp.* pequenos**

Este grupo engloba as espécies *M. daubentonii* (Pouco Preocupante), *M. bechsteinii* (Em Perigo), *M. emarginatus* (Informação Insuficiente), *M. escalerae* (Vulnerável) e *M. mystacinus* (Informação Insuficiente).

Na Área de Influência do AHBS não foi detectada a ocupação de abrigos por indivíduos de espécies pertencentes a este complexo (ver **Tabela 4.1** e **Figura 4.7**).

Na Área Controlo, a presença de *Myotis spp.* pequenos foi detectada em 3 abrigos, todos do tipo edifício rural (ver **Tabela 4.1** e **Figura 4.7**).

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	---




Figura 4.7 – Abrigos onde se registou ocupação por morcegos do complexo *Myotis spp.* pequenos durante a campanha de Outono de 2011.

***Miniopterus schreibersii* (Vulnerável)**

Na Área de Influência do AHBS, a espécie foi detectada apenas em 3 abrigos, todos do tipo cavernícola e classificados como Abrigo de Importância Nacional (ver **Tabela 4.1** e **Figura 4.8**).

Na Área Controlo a espécie foi detectada em 3 abrigos, do tipo cavernícola, 1 dos quais considerado Abrigo de Importância Nacional (ver **Tabela 4.1** e **Figura 4.8**).

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	---




Figura 4.8 – Abrigos onde se registou ocupação por morcegos da espécie *Miniopterus schreibersii* durante a campanha de Outono de 2011.

Tadarida teniotis (Informação Insuficiente)

Na Área de Influência do AHBS, a espécie foi detectada apenas em 1 abrigo, do tipo edifício, considerado Abrigo de Importância Nacional (ver **Tabela 4.1** e **Figura 4.9**).

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	---




Figura 4.9 – Abrigos onde se registou ocupação por morcegos da espécie *Tadarida teniotis* durante a campanha de Outono de 2011.

Plecotus sp.

Na Área de Influência do AHBS, este género, do qual fazem parte as espécies *Plecotus auritus* (Informação Insuficiente) e *Plecotus austriacus* (Pouco Preocupante), foi detectado em 2 abrigos, do tipo cavernícola, sendo 1 deles classificado como Abrigo de Importância Nacional (ver **Tabela 4.1** e **Figura 4.10**). Apesar de ser evidente o género em causa, não foi possível realizar uma identificação específica com certeza, uma vez que os animais não foram manipulados para análise biométrica.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	--




Figura 4.10 – Abrigos onde se registou ocupação por morcegos do complexo *Plecotus sp.* durante a campanha de Outono de 2011.

Quirópteros Não Identificados

Na Área de Influência do AHBS, foram detectados quirópteros não identificados à espécie em 4 abrigos, do tipo cavernícola, 3 dos quais classificados como Abrigo de Importância Nacional (ver **Tabela 4.1** e **Figura 4.11**).

Na Área Controlo foram detectados quirópteros não identificados em 6 abrigos, todos do tipo cavernícola (ver **Tabela 4.1** e **Figura 4.11**).




Figura 4.11 – Abrigos onde se registou ocupação por morcegos Não Identificados durante a campanha de Outono de 2011.

Os resultados da análise estatística realizada para comparação da ocupação de abrigos, na Área de Influência do AHBS, entre as épocas de Outono de 2008, 2009, 2010 e 2011 são apresentados na **Tabela 4.2** e **Figura 4.12**. Nesta análise é possível observar uma tendência para o aumento do número médio de indivíduos por abrigo, não existindo no entanto diferenças estatisticamente significativas entre as épocas homólogas.

Tabela 4.2 – Resultados da análise não-paramétrica para comparação, entre épocas de Outono, dos dados de ocupação de abrigos na Área de Influência do AHBS (relembra-se que o tratamento estatístico apresentado não inclui os dados relativos aos Abrigos de Importância Nacional)

Conjunto de Dados	Kruskal-Wallis	P	Signific.
Total de Indivíduos/Abrigo	1.040	0.7916	ns

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	---




Figura 4.12 – Comparação entre épocas homólogas do número médio de indivíduos/abrigo, na Área de Influência do AHBS.

A **Tabela 4.3** e a **Figura 4.13** reflectem os resultados da análise estatística realizada para comparação da ocupação de abrigos, na Área Controlo, entre as épocas de Outono de 2009, 2010 e 2011. Nesta análise verifica-se a mesma tendência observada na Área de Influência do AHBS, não sendo, no entanto, esta tendência positiva estatisticamente significativa quando comparadas as épocas homólogas.

Tabela 4.3 – Resultados da análise não-paramétrica para comparação, entre épocas de Outono, dos dados de ocupação de abrigos na Área Controlo (relembra-se que o tratamento estatístico apresentado não inclui os dados relativos aos Abrigos de Importância Nacional e que no ano de 2008 não se efectuavam pontos em Área Controlo)

Conjunto de Dados	Kruskal-Wallis	P	Signific.
Total de Indivíduos/Abrigo	5.847	0.0537	ns

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	---




Figura 4.13 – Comparação entre épocas homólogas do número médio de indivíduos/abrigo, na Área Controlo.

Os resultados da análise estatística realizada para comparação da ocupação de abrigos entre zonas, para o Outono de 2011 são apresentados na **Tabela 4.4** e **Figura 4.14**. Nesta análise é possível verificar que o número médio de indivíduos por abrigo varia entre as várias zonas em análise, sendo estatisticamente significativa quando se compara zona inundável e zona não inundável. Nas restantes comparações entre as diferentes zonas não se verificam diferenças estatisticamente significativas (excluindo desta análise os Abrigos de Importância Nacional).

Tabela 4.4 – Resultados da análise não-paramétrica para comparação, entre áreas, dos dados de ocupação de abrigos para a Outono de 2011 (relembra-se que o tratamento estatístico apresentado não inclui os dados relativos aos Abrigos de Importância Nacional)

Conjunto de Dados	Kruskal-Wallis	P	Signific.	Dunn's Multiple Comparison Test		
				Difference in rank sum		Signific.
Total de Indivíduos/Abrigo	6.123	0.0468	*	Zona Inundável vs Zona Não Inundável	-15.00	* P<0,05
				Zona Inundável vs Zona Controlo	-7.481	ns
				Zona Não Inundável vs Zona Controlo	7.519	ns

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	---




Figura 4.14 – Comparação entre áreas do número médio de indivíduos/abrigo, para o Outono de 2011.

Detecção acústica por ultra-som

Durante a campanha de Outono de 2011, através da metodologia de detecção acústica de ultra-sons (ver **Figura 4.15** e **Figura 4.16**) foi possível identificar a presença de um mínimo de 14 espécies, podendo no entanto este número ser de 24 espécies, se considerarmos a possibilidade de algumas vocalizações gravadas pertencerem a indivíduos de espécies mais raras ou indivíduos pertencentes a grupos de espécies cuja distinção de vocalizações é impossível através deste método.




Figura 4.15 – Localização geral dos pontos de detecção acústica por ultra-sons.




Figura 4.16 – Localização geral dos pontos de detecção acústica por ultra-sons realizados nos açudes.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	---

No total dos 50 pontos amostrados mensalmente na Área de Influência do AHBS, foi detectada actividade de quirópteros em 48, durante o decurso da campanha trimestral (ver **Figura 4.17**). Relativamente à actividade de alimentação, detectada pelo registo de *feeding-buzzes*, esta foi registada em 33 pontos (ver **Figura 4.18**). Registou-se ainda *social calls* em 29 pontos da Área de Influência do AHBS (ver **Figura 4.19**).

No total dos 26 pontos amostrados mensalmente na Área Controlo, foi detectada actividade de quirópteros em 23 deles, durante o decurso da campanha trimestral (ver **Figura 4.17**). Relativamente à actividade de alimentação na Área Controlo, esta foi registada em 9 pontos da Área Controlo (ver **Figura 4.18**). Registou-se ainda *social calls* em 11 pontos controlo (ver **Figura 4.19**).

Quanto aos açudes, no total dos 21 pontos amostrados mensalmente, foi detectada actividade de quirópteros em 20 deles, durante o decurso da campanha trimestral (ver **Figura 4.17**). Relativamente à actividade de alimentação nas zonas de implementação dos açudes, esta foi registada em 16 dos 21 pontos (ver **Figura 4.18**). Registou-se ainda *social calls* em 15 açudes (ver **Figura 4.19**).




Figura 4.17 – Pontos onde foi registada presença de quirópteros durante a monitorização por detecção acústica (10min/ponto) realizada no decurso da campanha de Outono de 2011.




Figura 4.18 – Pontos onde foi registada actividade de alimentação de quirópteros durante a monitorização por detecção acústica (10min/ponto) realizada no decurso da campanha de Outono de 2011.




Figura 4.19 – Pontos onde foram registados *social calls* de quirópteros durante a monitorização por detecção acústica (10min/ponto) realizada no decurso da campanha de Outono de 2011.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	---

Rhinolophus ferrumequinum (Vulnerável)

A presença de indivíduos pertencentes à espécie *Rhinolophus ferrumequinum* foi registada em 4 pontos da Área Controlo (ver **Figura 4.20**).




Figura 4.20 – Localização dos pontos onde foi registada a ocorrência do complexo de espécies *Rhinolophus ferrumequinum* durante a campanha de Outono de 2011 (frequência de ocorrência trimestral entre 1 e 3).

Rhinolophus euryale / *R. mehelyi* (Criticamente em Perigo / Criticamente em Perigo)

Foi detectada a presença deste complexo apenas em um ponto da Área de Influência do AHBS (ver **Figura 4.21**).

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	---




Figura 4.21 – Localização dos pontos onde foi registada a ocorrência do complexo de espécies *Rhinolophus euryale* / *Rhinolophus mehelyi* durante a campanha de Outono de 2011 (frequência de ocorrência trimestral entre 1 e 3).

Pipistrellus pygmaeus* / *Miniopterus schreibersii (Pouco Preocupante / Vulnerável)

A presença de indivíduos pertencentes ao complexo *Pipistrellus pygmaeus* / *Miniopterus schreibersii* foi registada em 19 pontos da Área de Influência do AHBS, em 6 pontos da Área Controlo e em 14 dos açudes amostrados (ver **Figura 4.22**).




Figura 4.22 – Localização dos pontos onde foi registada a ocorrência do complexo de espécies *Pipistrellus pygmaeus* / *Miniopterus schreibersii* durante a campanha de Outono de 2011 (frequência de ocorrência trimestral entre 1 e 3).

Pipistrellus pipistrellus / *P. pygmaeus* / *M. schreibersii* (Pouco Preocupante / Pouco Preocupante / Vulnerável)

A presença de indivíduos pertencentes ao complexo *Pipistrellus pipistrellus* / *P. pygmaeus* / *M. schreibersii* foi registada em 38 pontos da Área de Influência do AHBS, em 16 pontos da Área Controlo e em 17 dos açudes amostrados (ver **Figura 4.23**).




Figura 4.23 – Localização dos pontos onde foi registada a ocorrência do complexo de espécies *Pipistrellus pipistrellus* / *P. pygmaeus* / *M. schreibersii* durante a campanha de Outono de 2011 (frequência de ocorrência trimestral entre 1 e 3).

Pipistrellus pipistrellus (Pouco Preocupante)

A presença de indivíduos pertencentes à espécie *P. pipistrellus* foi registada em 22 pontos da Área de Influência do AHBS, 11 pontos da Área Controlo e em 16 açudes (ver **Figura 4.24**).

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	---




Figura 4.24 – Localização dos pontos onde foi registada a ocorrência da espécie *P. pipistrellus* durante a campanha de Outono de 2011 (frequência de ocorrência trimestral entre 1 e 3).

***Miniopterus schreibersii* (Vulnerável)**

A presença desta espécie foi considerada como possível em 40 pontos diferentes da Área de Influência do AHBS, em 17 pontos da Área Controlo e em 19 açudes (ver **Figura 4.22** e **Figura 4.23**).

***Pipistrellus pygmaeus* (Pouco Preocupante)**

A presença desta espécie foi considerada como possível em 40 pontos diferentes da Área de Influência do AHBS, em 17 pontos da Área Controlo e em 19 açudes (ver **Figura 4.22** e **Figura 4.23**).

***Pipistrellus pipistrellus* (Pouco Preocupante)**

A presença desta espécie foi considerada como possível em 40 pontos diferentes da Área de Influência do AHBS, em 17 pontos da Área Controlo e em 19 açudes (ver **Figura 4.22**, **Figura 4.23** e **Figura 4.24**).

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	---

Pipistrellus kuhli (Pouco Preocupante)

A presença de indivíduos pertencentes à espécie *Pipistrellus kuhli* foi registada em 34 pontos da Área de Influência do AHBS, em 8 pontos da Área Controlo e em 13 açudes (ver **Figura 4.25**).




Figura 4.25 – Localização dos pontos onde foi registada a ocorrência da espécie *Pipistrellus kuhli* durante a campanha Outono de 2011 (frequência de ocorrência trimestral entre 1 e 3).

Eptesicus serotinus / *Eptesicus isabellinus* (Pouco Preocupante / -)

Durante a campanha de Verão de 2011, a presença de indivíduos pertencentes ao complexo *E. serotinus* / *E. isabellinus* foi registada em 3 pontos da Área de Influência do AHBS e em 2 pontos da Área Controlo (ver **Figura 4.26**). A presença de indivíduos pertencentes ao complexo *E. serotinus* / *E. isabellinus* / *N. leisleri*, ao qual esta espécie pertence, foi registada em 6 pontos da Área de Influência do AHBS, em 2 pontos da Área Controlo e em 2 açudes (ver **Figura 4.27**).

Assim, a presença deste complexo foi considerada como possível em 8 pontos diferentes da Área de Influência do AHBS, em 4 pontos da Área Controlo e 2 açudes.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	---




Figura 4.26 – Localização dos pontos onde foi registada a ocorrência da espécie *E. serotinus* / *E. isabellinus* durante a campanha de Outono de 2011 (frequência de ocorrência trimestral entre 1 e 3).




Figura 4.27 – Localização dos pontos onde foi registada a ocorrência do complexo de espécies *Eptesicus serotinus* / *E. isabellinus* / *Nyctalus leisleri* durante a campanha de Outono de 2011 (frequência de ocorrência trimestral entre 1 e 3).

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	---

Nyctalus leisleri (Informação Insuficiente)

Durante a campanha de Outono de 2011, a presença desta espécie foi registada em 4 pontos da Área de Influência do AHBS e num açude (ver **Figura 4.28**). A presença de indivíduos pertencentes ao complexo *E. serotinus* / *E. isabellinus* / *N. leisleri*, ao qual esta espécie pertence, foi registada em 6 pontos da Área de Influência do AHBS, em 2 pontos da Área Controlo e em 2 açudes (ver **Figura 4.27**).

Assim, a presença desta espécie foi considerada como possível em 10 pontos diferentes da Área de Influência do AHBS, em 2 pontos da Área Controlo e em 2 açudes.




Figura 4.28 – Localização dos pontos onde foi registada a ocorrência da espécie *Nyctalus leisleri* durante a campanha de Outono de 2011 (frequência de ocorrência trimestral entre 1 e 3).

Nyctalus lasiopterus / *Nyctalus noctula* (Informação Insuficiente / Informação Insuficiente)

A presença deste complexo de espécies foi registada em 2 pontos da Área de Influência do AHBS, 2 pontos da Área Controlo e em 1 açude (ver **Figura 4.29**).

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	---




Figura 4.29 – Localização dos pontos onde foi registada a ocorrência do complexo de espécies *Nyctalus lasiopterus* / *Nyctalus noctula* durante a campanha de Outono de 2011 (frequência de ocorrência trimestral entre 1 e 3).

***Myotis* spp. pequenos**

Este grupo engloba as espécies *M. daubentonii* (Pouco Preocupante), *M. bechsteinii* (Em Perigo), *M. emarginatus* (Informação Insuficiente), *M. escalerae* (Vulnerável) e *M. mystacinus* (Informação Insuficiente).

A presença deste complexo de espécies foi registada em 10 pontos da Área de Influência do AHBS, 2 pontos da Área Controlo e 4 açudes (ver **Figura 4.30**). As características das vocalizações registadas não permitiram identificar qual das espécies foi detectada.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	---




Figura 4.30 – Localização dos pontos onde foi registada a ocorrência do complexo de espécies “*Myotis spp. pequenos*” durante a campanha de Outono de 2011 (frequência de ocorrência trimestral entre 1 e 3).

Myotis daubentonii (Pouco Preocupante)

Durante a campanha de Outono de 2011, a presença desta espécie foi registada em 4 pontos da Área de Influência do AHBS e 1 açude (ver **Figura 4.31**). A presença de indivíduos pertencentes ao complexo “*Myotis spp. pequenos*”, ao qual esta espécie pertence, foi registada em 10 pontos da Área de Influência do AHBS, 2 pontos da Área Controlo e 4 açudes (ver **Figura 4.30**). A identificação desta espécie foi efectuada através do registo de vocalizações com as características diagnosticantes (nomeadamente amplitude modelada).

Assim, a presença desta espécie foi considerada como possível em 10 pontos diferentes da Área de Influência do AHBS, 2 pontos da Área Controlo e em 4 açudes.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	---




Figura 4.31 – Localização dos pontos onde foi registada a ocorrência da espécie *Myotis daubentonii* durante a campanha de Outono de 2011 (frequência de ocorrência trimestral entre 1 e 3).

Myotis myotis* / *M. blythii (Vulnerável / Criticamente em Perigo)

Durante a campanha de Outono de 2011, a presença deste complexo de espécies foi registada em 2 pontos da Área de Influência do AHBS, num ponto da Área Controlo e num açude (ver **Figura 4.32**).

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	---




Figura 4.32 – Localização dos pontos onde foi registada a ocorrência do complexo de espécies *Myotis myotis* / *Myotis blythii* durante a campanha de Outono de 2011 (frequência de ocorrência trimestral entre 1 e 3).

***Plecotus* sp.**

A presença deste complexo de espécies, do qual fazem parte as espécies *Plecotus auritus* (Informação Insuficiente) e *Plecotus austriacus* (Pouco Preocupante), foi registada em 3 pontos da Área de Influência do AHBS, em 2 pontos da Área Controlo e em 1 açude (ver **Figura 4.33**). As características das vocalizações registadas não permitiram identificar qual das espécies deste género foi detectada.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	---




Figura 4.33 – Localização dos pontos onde foi registada a ocorrência de *Plecotus sp.* durante a campanha de Outono de 2011 (frequência de ocorrência trimestral entre 1 e 3).

Tadarida teniotis (Informação Insuficiente)

A presença desta espécie foi registada em 27 pontos da Área de Influência do AHBS, 6 pontos da Área Controlo e 9 açudes (ver **Figura 4.34**).




Figura 4.34 – Localização dos pontos onde foi registada a ocorrência da espécie *Tadarida teniotis* durante a campanha de Outono de 2011 (frequência de ocorrência trimestral entre 1 e 3).

Barbastella barbastellus (Informação Insuficiente)

A presença desta espécie foi registada apenas num ponto da Área de Influência do AHBS e em 4 pontos da Área de Controlo (ver **Figura 4.35**).

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--




Figura 4.35 – Localização dos pontos onde foi registada a ocorrência da espécie *Barbastella barbastellus* durante a campanha de Outono de 2011 (frequência de ocorrência trimestral entre 1 e 3).

Quirópteros Não Identificados

Nos casos em que há menor qualidade de gravação e/ou existiram dificuldades na medição das variáveis sonoras, não foi possível identificar a(s) espécie(s) cuja actividade foi registada em 17 pontos da Área de Influência do AHBS, 8 pontos da Área Controlo e 4 açudes (ver **Figura 4.36**) tendo-se optado por classificar como Quirópteros Não Identificados.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	---




Figura 4.36 – Localização dos pontos onde foi registada a ocorrência de Quirópteros Não Identificados durante a campanha de Outono de 2011 (frequência de ocorrência trimestral entre 1 e 3).

Os resultados da análise estatística realizada para comparação da ocorrência de espécies entre as épocas de Outono de 2009, 2010 e 2011, na Área de Influência do AHBS, são apresentados na **Tabela 4.5**.

Tabela 4.5 – Resultados da análise de Chi-Quadrado para comparação, entre épocas homólogas, dos dados das espécies ou complexos de espécies, na Área de Influência do AHBS

Conjunto de Dados de Ocorrência	Chi2	df	P	Significância
E. serotinus / E. isabellinus	2.970	2	0.2265	Não Significativo
T. teniotis	26.10	2	< 0.0001	*** Significativo
P. kuhli	35.67	2	< 0.0001	***Significativo
P.pipistrellus/ P.pygmaeus/ M. schreibersii	19.31	2	< 0.0001	*** Significativo

Os resultados da análise estatística realizada para comparação da ocorrência de espécies entre as épocas de Outono de 2009, 2010 e 2011, na Área Controlo, são apresentados na **Tabela 4.6**.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

Tabela 4.6 – Resultados da análise de Qui-Quadrado para comparação, entre épocas homólogas, dos dados de ocorrência das espécies ou complexos de espécies, na Área Controlo

Conjunto de Dados de Ocorrência	Chi2	df	P	Significância
E. serotinus / E. isabellinus	2.161	2	0.3394	Não Significativo
T. teniotis	3.849	2	0.1460	Não Significativo
P. kuhli	10.21	2	0.0061	**Significativo
P.pipistrellus/ P.pygmaeus/ M. schreibersii	16.26	2	0.0003	*** Significativo

Em relação ao complexo *E. serotinus* / *E. isabellinus* não se verificam diferenças significativas no número de ocorrências em pontos de amostragem acústica, quer em relação à Área de Influência do AHBS, quer à Área Controlo (ver **Tabela 4.5**, **Tabela 4.6** e **Figura 4.37**).




Figura 4.37 – Comparação entre épocas de Outono do número de pontos de acústica em que foi detectada a ocorrência do complexo *E. serotinus* / *E. isabellinus* (percentagem de ocorrência).

Relativamente à espécie *T. teniotis*, pode-se observar uma tendência para o aumento do número de ocorrências em pontos de amostragem acústica, sendo que na Área de Influência do AHBS estas diferenças entre anos são muito significativas entre o ano de 2011 e os dois anos anteriores, não se verificando, no entanto, diferenças estatisticamente significativas para a Área Controlo (ver **Tabela 4.5**, **Tabela 4.6** e **Figura 4.38**).

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	---




Figura 4.38 – Comparação entre épocas de Outono do número de pontos de acústica em que foi detectada a ocorrência da espécie *T. teniotis* (percentagem de ocorrência).

No caso da espécie *P. kuhli* e do complexo *P. pipistrellus* / *P. pygmaeus* / *M. schreibersii* verifica-se também uma tendência para o aumento do número de pontos de monitorização acústica onde foi registada como possível a ocorrência desta espécie e deste complexo de espécies, tendo-se verificado, em ambos os casos, a existência de diferenças significativas entre épocas homólogas de Outono, quer para a Área de Influência do AHBS, quer para a Área Controlo (ver **Tabela 4.5**, **Tabela 4.6**, **Figura 4.39** e **Figura 4.40**).




Figura 4.39 – Comparação entre épocas de Outono do número de pontos de acústica em que foi detectada a ocorrência da espécie *P. kuhli* (percentagem de ocorrência).

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	--




Figura 4.40 – Comparação entre épocas de Outono do número de pontos de acústica em que foi detectada a ocorrência do complexo *P. pipistrellus* / *P. pygmaeus* / *M. schreibersii* (percentagem de ocorrência).

4.2 – Discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos

O período em que decorreu esta campanha corresponde fenologicamente à fase de pré-hibernação, durante a qual os morcegos acumulam reservas energéticas sob a forma de gordura de modo a suportar o período de latência que se aproxima.

Na presente campanha é de salientar o registo de M62 – Mina Qt.^a da Laranjeira, onde foram observados 63 indivíduos do género *Rhinolophus*. Este é um registo importante, tendo em conta o número de animais envolvidos, as espécies em causa, a tipologia de abrigo e o facto de se encontrar muito próximo da futura área de albufeira. Acresce que nas épocas anteriores de Verão, Primavera e Inverno de 2011, foram igualmente registados números consideráveis de *Rhinolophus* sp. e *M. schreibersii*, o que comprova a utilização do abrigo em diferentes fases do ciclo anual. Tendo em conta tudo o que foi referido anteriormente, este abrigo poder-se-á afigurar como um potencial alvo de futuras acções compensatórias. Salienta-se ainda o registo M68 – Mina de Reboredo com cerca de 80 indivíduos do género *Rhinolophus*, pelos números registados.

Relativamente ao M40 – Abrigo Construído (Escalão Montante), nesta campanha foram observados 2 *Rhinolophus* sp, continuando a registar-se um número reduzido de indivíduos neste abrigo compensatório.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	--

A comparação de dados de abrigos monitorizados na época homóloga do ano anterior evidencia um aumento no número médio de indivíduos por abrigo, ainda que estatisticamente não existam diferenças entre épocas homólogas, quer para a Área de Influência do AHBS, quer para a Área Controlo. Este aumento no número médio de indivíduos por abrigo ao longo das quatro épocas homólogas poderá não corresponder a um aumento geral no número de indivíduos registados nos abrigos, mas sim decorrer da inclusão na lista de abrigos monitorizados de novos abrigos que geralmente apresentam um número elevado de indivíduos. No entanto, esta análise requer algum cuidado nas inferências que se possam fazer, pois estas são necessariamente limitadas.

Relativamente à monitorização por detecção acústica, salienta-se, entre os resultados gerais, o facto de se ter registado actividade de morcegos na quase totalidade dos pontos das três áreas consideradas. Este facto decorrerá do aumento do esforço em termos de cobertura espacial e temporal que tem vindo a ser levado a cabo e de, fenologicamente, esta época corresponder a um período com maior actividade e interacção intraespecífica, demonstrando assim a importância desta área para este grupo faunístico. É de realçar, igualmente, o considerável número de espécies registadas (variando entre um mínimo de 14 e um máximo de 24), com especial relevância para espécies arborícolas (como por exemplo as espécies do género *Nyctalus*) ou fissurícolas (por exemplo *T. teniotis*). Destaca-se também a detecção de ocorrência, ainda que ocasional, de espécies / complexos raros, como por exemplo de *B. barbastellus* ou *Plecotus sp.*

Os resultados da análise estatística realizada para comparação da ocorrência de espécies entre as épocas de Outono de 2009, 2010 e 2011 revelaram existir diferenças significativas para o complexo *P.pipistrellus* / *P.pygmaeus* / *M. schreibersii* (ver **Tabela 4.5** e **Tabela 4.6**). Ao longo dos três anos verificou-se um aumento no número de pontos onde foi detectada a ocorrência deste complexo (ver **Figura 4.40**). Sendo este um grupo que engloba várias espécies localmente comuns e com uma vasta dispersão pela área de estudo, poderá ser um bom grupo indicador de impactes sobre a comunidade local de quirópteros. Importa assim ter uma série temporal mais alargada para avaliar o real significado destes resultados, pois podem representar apenas flutuações naturais (apesar de estatisticamente relevantes). Estes resultados são semelhantes para o caso de *P. kuhli*, uma espécie também relativamente comum, onde existe igualmente um aumento no número de pontos com ocorrência registada para a época em análise (ver **Tabela 4.5**, **Tabela 4.6** e **Figura 4.39**). Este facto é corroborado pela diferença estatisticamente significativa na análise efectuada entre épocas homólogas.

Relativamente ao complexo *E.serotinus/isabellinus*, o tratamento estatístico indicou não existirem diferenças significativas entre épocas homólogas, tendo-se registado a ocorrência deste género de quirópteros num reduzido número de pontos (ver **Tabela 4.5**, **Tabela 4.6** e **Figura 4.37**).

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	--

No caso de *T. teniotis*, a análise estatística revelou existirem diferenças significativas entre as épocas, na Área de Influência do AHBS. Verificou-se também um acréscimo no número de pontos onde se detectou a ocorrência desta espécie, quer na Área de Influência do AHBS, quer na Área Controlo (ver **Tabela 4.5**, **Tabela 4.6** e **Figura 4.38**). Este acréscimo poder-se-á dever ao facto de ter havido uma redefinição das épocas de monitorização, o que levou a que a época de Outono passasse a incluir duas campanhas mensais de monitorização acústica (Setembro e Outubro). Assim, na época de Outono de 2011 houve uma duplicação do esforço temporal relativamente às épocas homólogas anteriores, o que necessariamente aumenta a probabilidade de detecção desta espécie em pontos distintos. Este facto pode também influenciar os resultados das restantes espécies já referidas anteriormente.

4.3 – Avaliação da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de monitorização

Os impactes decorrentes do período de construção prendem-se com a realização das obras e com o ruído associado às mesmas, com movimentações anormais de máquinas e pessoas, afectando tanto os habitats de alimentação, como os abrigos (com especial incidência nos abrigos do escalão de montante).

Relativamente ao abrigo M40 que foi construído como medida de compensação, importa referir que as medidas de prevenção de perturbação na galeria foram já adoptadas, nomeadamente a instalação de gradeamento adequado para evitar a entrada de pessoas não autorizadas no local. Esta medida está a revelar-se eficaz, visto que, por um lado não foram registados indícios de presença humana, e por outro confirmou-se a ocupação do abrigo. Contudo, a colonização deste abrigo tem sido lenta (em simultâneo no máximo apenas foram registados 3 indivíduos).

Assim, poderemos assumir que na actualidade a atractividade deste novo abrigo e da sua zona de implementação é ainda baixa. Devido ao facto de este abrigo ocorrer na proximidade das obras do escalão de montante, será de equacionar que a sua localização é afectada pela presença das obras, condicionando o seu uso pelos morcegos. Finalmente, a baixa colonização deste novo abrigo, poderá estar relacionada com a idade do próprio abrigo e o facto de toda a estrutura ser recente, bem como às condições microclimáticas não serem as ideais dentro do abrigo, podendo condicionar o seu uso por parte dos quirópteros.

Desta forma, será de supor que o actual período de latência até uma colonização em pleno será relativamente longo, pelo que só a continuação da monitorização é que poderá avaliar quanto tempo será necessário para registar o sucesso de colonização.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	---

Em relação ao normal decorrer das obras, realça-se que devem ser limitadas as áreas de intervenção fora da execução do projecto (em especial dentro e na proximidade do leito do rio), devendo estas centrar-se essencialmente na envolvente das barragens, minimizando o nível e extensão da perturbação. Se houver necessidade de efectuar intervenções na proximidade de abrigos já identificados, deverá ser necessário adoptar medidas similares às que foram adoptadas para os abrigos que existiam no Escalão de Montante (galerias seladas, cujas medidas foram especificadas em anteriores relatórios).

Assim, de uma forma geral, as medidas de mitigação que já foram adoptadas parecem ter sido suficientes para minimizar impactes sobre esta comunidade.

Ainda no que se refere ao novo abrigo, de momento não é possível dizer que esta estrutura de compensação é suficiente para albergar a mesma quantidade de animais que as seis galerias de prospecção albergavam no passado. Será preciso mais algum tempo de colonização para avaliar este sucesso.

A continuação dos estudos demonstra-se como fundamental, pois permitirá avaliar as respostas comportamentais da espécie à construção das barragens e consequente alteração dos seus habitats de alimentação e reprodução, bem como avaliar a eficácia das medidas de minimização adoptadas. A campanha de referência, assim como as futuras campanhas de monitorização, apresentam-se como essenciais nessa avaliação.

4.4 – Comparação com as previsões efectuadas no EIA

Como referido no EIA (2004), na fase de construção os efeitos poderão surgir ao nível dos biótopos ribeirinhos e ripícolas (zonas de alimentação) provocados pelas obras e consequente aumento da perturbação a diversos níveis, que afectarão sobretudo as zonas próximas do escalão de montante. Nesta fase os impactes ocorrerão também devido à destruição dos abrigos que existem nas galerias de prospecção.

De uma maneira geral o impacte, decorrente desta fase, será negativo, de magnitude moderada a elevada, certo e localizado, temporário, imediato, mas mitigável através da construção de novos abrigos. Com a construção do escalão poderá surgir uma barreira permanente à circulação de indivíduos de jusante para montante (e vice-versa).

Na presente campanha ainda não foi possível detectar sinais que estejam a ocorrer impactes significativos sobre os quirópteros, apesar de ser expectável que os impactes esperados e

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

mencionados no EIA se verifiquem, especialmente aquando da destruição dos abrigos e após o período de desmatção, que será a acção mais perturbadora, antes do enchimento da albufeira.

5 – CONCLUSÃO

5.1 – Síntese da avaliação dos impactes objecto de monitorização e da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de monitorização

No decurso desta campanha não foram registados impactes sobre os abrigos de quirópteros monitorizados, nem ao nível da distribuição das espécies e utilização do espaço decorrentes das obras de construção dos escalões de montante e jusante.

5.2 – Proposta de novas medidas de mitigação e ou de alteração ou desactivação de medidas já adoptadas

Não existem novas medidas de mitigação a propor.

Tendo em conta o sucesso na implementação das medidas anteriormente propostas para o novo abrigo (após transferência dos quirópteros para este abrigo e a selagem dos antigos abrigos nas galerias de exploração do escalão de montante de seguida), recomenda-se, somente, que haja continuidade na sua aplicação, com vista a minimizar eventuais impactes decorrentes das obras na proximidade do Novo Abrigo, designadamente através da:

1. Implementação de uma área de restrição ao uso de explosivos em torno do novo abrigo;
2. Implementação de uma área de proibição de circulação de máquinas e veículos em torno do novo abrigo, sendo que para isso não se devem utilizar áreas foras das previstas em projecto.

5.3 – Proposta de revisão dos programas de monitorização e da periodicidade dos futuros relatórios de Monitorização

Os Programas de Monitorização foram revistos recentemente, pelo que, no presente relatório, não será proposta qualquer alteração ao Programa de Monitorização de Fauna.

Aguardamos a disponibilização do COS 2007 (nível 3 ou superior), de forma a ser possível implementar a totalidade do novo Programa de Monitorização.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor	
	RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	AHBS/RMQ.13.01

ANEXO I

BIBLIOGRAFIA

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

Ahlén, I. & Baagoe, H.J. (1999). Use of ultrasound detectors for bat studies in Europe: experiences from field identification, surveys and monitoring. *Acta Chiropterologica* **1**: 137-150.

Barataud, M. (1996). Ballades dans l'in audible. Sittelle, Mens .

Barlow, K.E & G. Jones 1997. Differences in songflight calls and social calls between two phonic types of vespertilionid bat *Pipistrellus pipistrellus*. *Journal of Zoology, London* **241**: 315-324.

Cabral, M.J. (coord.) Almeida, J. Almeida, P.R. Dellinger, T. Ferrand de Almeida, N. Oliveira, M.E. Palmeirim, JM. Queiroz, Al. Rogado, L. & Santos-Reis, M. (eds) 2005. Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. ICN. Lisboa.

Denzinger, A., Siemers, B.M., Shaub, A., & Schnitzler, H.U. (2001). Echolocation by the barbastella barbastellus. *Journal of Comparative Physiology* **187**: 521-528.

Dietz, C. & von Helversen, O. (2004). Illustrated key to the bats of Europe. Electronic Publication, V 1.0 released 15.12.2004.

Dietz, C., O. von Helversen & D. Nill 2009. Bats of Britain, Europe & Northwest África. A&C Black.

EDP 2006. Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor. EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A.

EIA 2004. Avaliação Comparada dos Aproveitamentos Hidroeléctricos do Baixo Sabor e do Alto Côa. CPPE – Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade, S.A.

Jensen, M.E. & Miller, L.A. (1999). Echolocation signals of the bat *Eptesicus serotinus* recorded using a vertical microphone array: effect of flight altitude on searching signals. *Behavioural Ecology and Sociobiology* **47**: 60-69.

Jones, G. & Rayner, J.M.V. (1989). Foraging behaviour and echolocation of wild horseshoe bats *Rhinolophus ferrumequinum* and *R. hipposideros* (Chiroptera, Rhinolophidae). *Behavioural Ecology and Sociobiology* **25**: 183-191.

Jones, G. (1999). Scaling of echolocation call parameters in bats. *Journal of Experimental Biology* **202**: 3359-3367.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	--

Jones, G., Vaughn, N., & Parsons, S. (2000). Acoustic identification of bats from directly sampled and time expanded recordings of vocalizations. *Acta Chiropterologica* **2**: 155-170.

Jones, G. (2005). Echolocation. *Current Biology* **15**: 484-488.

Jones, G. (2008). Sensory ecology: echolocation calls are used for communication. *Current Biology* **18**: 34-35.

Kalko, E. & Schnitzler, H. U. (1989). The echolocation and hunting behaviour of Daudenton's bat, *Myotis daudentonii*. *Behavioural Ecology and Sociobiology* **24**: 225-238.

Knorschild, M., Helversen, O. & Mayer, F. (2007). Twin siblings sound alike: isolation call variation in the noctule bat, *Nyctalus noctula*. *Animal Behaviour* **74**: 105-1063.

Mathias, M.L., Santos-Rais, M., Palmeirim, & Ramalhinho, M. (1999). Guia dos mamíferos terrestres de Portugal continental, Açores e Madeira. Instituto da Conservação da Natureza, Lisboa.

Obrist, M.K., Boesch, R. & Flükiger, P.F. (2004). Variability in echolocation call design of 26 Swiss bat species: consequences, limits and options for automated field identification with a synergetic pattern recognition approach. *Mammalia* **68**: 307-322.

Parsons, S. & Jones, G. (2000). Acoustic identification of twelve species of echolocation bat by discriminant function analysis and artificial neural networks. *Journal of Experimental Biology* **203**: 2641-2656.

Pfalzer, G. & Kush, J. (2003). Structure and variability of bat social calls: implications for specificity and individual recognition. *Journal of Zoology, London* **261**: 21-33.

Raíño, A., L. Rodrigues, S. Bicho, C. Franco & J. Palmeirim (1998). Morcegos das Áreas Protegidas Portuguesas I (PN Peneda-Gerês, PN Montesinho, PN Alvão, PN Serra da Estrela, PN Serra de Aire e Candeeiros, PN de S. Mamede, PN Arrábida, RN Estuário do Sado e PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina). Estudos de Biologia e Conservação da Natureza, 26. ICN, Lisboa.

Raíño, A. (2007). Summer foraging habitats of bats in a Mediterranean region of the Iberian Peninsula. *Acta Chiropterologica* **9**: 171-181.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

Ribeiro, R., Ribeiro, S. B. & Álvares, F. (2005). Caracterização da situação actual dos quirópteros (morcegos) na área de implantação do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (Trás-os-Montes). Relatório do CIBIO.

Russo, D. & Jones, G. (1999). The social calls of Kuhl's pipistrelles *Pipistrellus kuhlii* (Kuhl, 1819): structure and variation (Chiroptera: Vespertilionidae). *Journal of Zoology, London* **249**: 476-481.

Russo, D. & Jones, G. (2002). Identification of twenty-two bat species (Mammalia: Chiroptera) from Italy by analysis of time-expanded recordings of echolocation calls. *Journal of Zoology, London* **258**: 91-103.

Russo, D. & Jones, G. (2003). Use of foraging habitats by bats in a Mediterranean area determined by acoustic surveys: conservation implications. *Ecography* **26**: 197-209.

Russo, D. & Jones, G. (2002). Identification of twenty-two bat species (Mammalia: Chiroptera) from Italy by analysis of time-expanded recordings of echolocation. *Journal of Zoology, London* **258**: 91-103.

Russo, D., Jones, G., & Arletaz, R. (2007). Echolocation and passive listening by foraging mouse-eared bats *Myotis myotis* and *M. blythii*. *Journal of Experimental Biology* **210**: 166-176.

Schumm, A., Krull, D. & Neuweiler, G. (1991). Echolocation in the notch-eared bat, *Myotis emarginatus*. *Behavioural Ecology and Sociobiology* **28**: 255-261.

Siemers, B.M., & Schnitzler, H.U. (2004). Echolocation signals reflect niche differentiation in five sympatric congeneric bat species. *Nature* **429**: 657-661.

Vaughan, N., Jones, G. & Harris, S. (1997). Habitat use by bats (Chiroptera) assessed by means of broad-band acoustic method. *Journal of Experimental Biology* **34**: 716-730.

Referências Electrónicas

www.batecho.com

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	---

ANEXO II

SÍNTESE DAS VARIÁVEIS DIAGNOSTICANTES PARA A IDENTIFICAÇÃO ACÚSTICA DE QUIRÓPTEROS

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor	
	RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	AHBS/RMQ.13.01

Espécie / Grupo	Frequência máxima energia (kHz)	Frequência máxima (kHz)	Frequência mínima (kHz)	Estrutura do pulso	Duração dos pulsos (ms)	Intervalo entre pulsos (ms)	Observações
<i>Rhinolophus hipposiderus</i>	105 – 115	-	-	CF	Variável	Variável	-
<i>Rhinolophus euryale / mehelyi</i>	100 – 104	-	-	CF	Variável	Variável	-
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	80 – 84	-	-	CF	Variável	Variável	-
<i>Myotis myotis / blythii</i> (Myotis grandes)	30 – 35	≤ 60	≥ 20	stFM	2 - 6	≤ 100	Não é possível distinguir as vocalizações das duas espécies; frequência central nos 35 kHz.
<i>Myotis daubentonii / bechsteinii / emarginatus / nattereri / mystacinus</i> (Myotis pequenos)	40 – 50	Variável	Variável	stFM	2 – 6	≤ 100	Só é possível distinguir algumas espécies dentro do grupo; frequência central nos 45 kHz.
<i>Myotis daubentonii</i>	45 (40 – 50)	95	35	stFM	2 – 5	≤ 100	Oscilograma sinusoidal, amplitude modelada; taxa de repetição média de 15 pps; frequentemente revela na parte terminal um curto segmento FM descendente quando ecolocaliza próximo da água ou solo.

Tabela 1 – Síntese das variáveis diagnosticantes das vocalizações de Quirópteros para diferenciar as diversas espécies / grupos de espécies.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor					
	RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011					AHBS/RMQ.13.01

<i>Myotis nattereri</i>	40 – 42 (40 – 50)	110	20	stFM	2 – 4	≤ 100	A frequência final (20kHz) sofre poucas variações, mesmo com proximidade de objectos; BW muito alargado.
<i>Myotis mystacinus</i>	Variável	≤ 100	≥ 25	stFM	2 – 6	≤ 100	Dois tipos de sinais, apenas um permite a identificação (frequência central no 50kHz); é muito difícil identificar esta espécie pois apenas as vocalizações com frequência de máxima energia de 50 kHz o permitem; pode ser confundido com <i>Pipistrellus pygmaeus</i> em ambientes fechados.
<i>Miniopterus schreibersii</i>	50 (50 – 60)	-	-	FM – qCF	≤ 8	≤ 100	Ecolocalização semelhante à de <i>P. pygmaeus</i> , considerando-se, para efeitos deste estudo, estas duas espécies como um complexo; esta espécie só é localmente abundante próximo de abrigos, na ausência de abrigos conhecidos assume-se que estas vocalizações pertencem a <i>P. pygmaeus</i> (no caso específico do Baixo Sabor é uma espécie localmente abundante)

Tabela 1 – Síntese das variáveis diagnosticantes das vocalizações de Quirópteros para diferenciar as diversas espécies / grupos de espécies (Cont.)

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor		
	RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011		AHBS/RMQ.13.01

Espécie / Grupo	Frequência máxima energia (kHz)	Frequência máxima (kHz)	Frequência mínima (kHz)	Estrutura do pulso	Duração dos pulsos (ms)	Intervalo entre pulsos (ms)	Observações
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	55 (45 – 60)	-	≥ 45	FM – qCF (variável)	≤ 8	≤ 100	Eclocalização semelhante à de <i>M. schreibersii</i> , considerando-se, para efeitos deste estudo, estas duas espécies como um complexo; distribuição ampla em Portugal; o valor da frequência mínima poderá, consoante os casos, ser uma característica distintiva <i>P. pipistrellus</i> .
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	45 (41 – 51)	-	42 – 48	FM – qCF (variável)	≤ 8	≤ 100	Distribuição mais frequente no norte de Portugal; o valor da frequência mínima poderá consoante os casos ser uma característica diagnosticante; devido à gama de sobreposição da FmaxE e da frequência mínima, esta espécie poderá não ser distinguível de <i>P. pygmaeus</i> e <i>M. schreibersii</i> .

Tabela 1 – Síntese das variáveis diagnosticantes das vocalizações de Quirópteros para diferenciar as diversas espécies / grupos de espécies (Cont.)

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor	
	RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	AHBS/RMQ.13.01

Espécie / Grupo	Frequência máxima energia (kHz)	Frequência máxima (kHz)	Frequência mínima (kHz)	Estrutura do pulso	Duração dos pulsos (ms)	Intervalo entre pulsos (ms)	Observações
<i>Pipistrellus kuhli</i>	38 (36 – 45)	-	37 – 41	FM – qCF (variável)	8 – 12	100 – 200	Distribuição ampla em Portugal, sendo mais frequente no sul; o valor da frequência mínima poderá, consoante os casos, ser uma característica diagnosticante.
<i>Plecotus austriacus / auritus</i>	35 (40 – 50)	Variável	≥ 40	stFM (pares de pulsos)	2 – 6	≤ 100	Não é possível distinguir as duas espécies através das suas vocalizações; este grupo é de difícil detecção devido à baixa intensidade das vocalizações (espécies sussurrantes); uma das características diagnosticantes é o facto de emitir pares de pulsos.
<i>Hypsugo savii</i>	30 – 35	-	-	qCF (shFM)	≤ 15	≥ 150	Rápido aumento de amplitude no início do pulso (verificável no oscilograma).

Tabela 1 – Síntese das variáveis diagnosticantes das vocalizações de Quirópteros para diferenciar as diversas espécies / grupos de espécies (Cont.)

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor	
	RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	AHBS/RMQ.13.01

Espécie / Grupo	Frequência máxima energia (kHz)	Frequência máxima (kHz)	Frequência mínima (kHz)	Estrutura do pulso	Duração dos pulsos (ms)	Intervalo entre pulsos (ms)	Observações
<i>Eptesicus serotinus/ E. isabellinus</i>	23 – 34	Variável	Variável	FM – qCF (variável)	Variável	Variável	Têm uma ecolocalização muito plástica; possível confusão com <i>Nyctalus leisleri</i> pois em meio fechado esta espécie deixa de fazer alternância de sinal; a distinção entre ambos, se possível, baseia-se no facto de <i>E. serotinus</i> apresentar pulsos mais curto e frequentemente emitir harmónicas.
<i>Nyctalus leisleri</i>	23 – 28	-	-	FM – qCF (alternância de sinal)	9 – 15	≥ 200	Geralmente emite acima dos 22 kHz; na ausência de alternância de sinal pode ser identificado como <i>E. serotinus</i> ; <i>N. leisleri</i> apresenta variáveis de tempo mais longas do que <i>E. serotinus</i> e potencial alternância de sinal.
<i>Nyctalus lasiopterus / noctula</i>	18 – 22	-	-	FM – qCF (alternância de sinal)	≥ 15	≥ 200	Não é possível distinguir as duas espécies; devido à raridade de <i>N. noctula</i> em Portugal assume-se usualmente que estas vocalizações pertencem a <i>N. lasiopterus</i> .

Tabela 1 – Síntese das variáveis diagnosticantes das vocalizações de Quirópteros para diferenciar as diversas espécies / grupos de espécies (Cont.)

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor	
	RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	AHBS/RMQ.13.01

Espécie / Grupo	Frequência máxima energia (kHz)	Frequência máxima (kHz)	Frequência mínima (kHz)	Estrutura do pulso	Duração dos pulsos (ms)	Intervalo entre pulsos (ms)	Observações
<i>Barbastella barbastellus</i>	33 – 44	-	-	FM – qCF (alternância de sinal)	Pulso tipo I – 2,5; Pulso tipo II - 6	80 – 150	Alternância de sinal com diferentes frequências.
<i>Tadarida teniotis</i>	9 – 14	-	-	qCF	≥ 15	> 300	Harmónicas frequentes; único morcego audível na Europa; no heterodino pode ser confundido com <i>social calls</i> de <i>Pipistrellus</i> spp.

Tabela 1 – Síntese das variáveis diagnosticantes das vocalizações de Quirópteros para diferenciar as diversas espécies / grupos de espécies (Cont.)

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor	
	RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	AHBS/RMQ.13.01

ANEXO III

TABELAS DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

Tabela 1 – Localização dos abrigos potenciais de Quirópteros prospectados.

Abrigo	Coordenadas UTM	
M01	683396	4585310
M02	685453	4586253
M03	680298	4575206
M05	679728	4574105
M18	662002	4563762
M19	669366	4565516
M23	677131	4569146
M24	675521	4569497
M25	675098	4570057
M30	682928	4582861
M31	692535	4590658
M32	691928	4591603
M34	682341	4564623
M35	671481	4561014
M36	671118	4562381
M37	677434	4560618
M38	667620	4567041
M39	673337	4566265
M40	665984	4565563
M46	669499	4566112
M47	669431	4566073
M48	669439	4565721
M49	680252	4566913
M50	678434	4566053
M51	676769	4565911
M52	680430	4565718
M53	680671	4575164
M54	683666	4575579
M55	684054	4584662
M56	667342	4567093
M57	667966	4567331
M58	669776	4567102
M59	670456	4567334
M60	670626	4567405
M61	691586	4592375
M62	663050	4563583
M63	671152	4562570

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	--

M64	671390	4562619
M65	672538	4573058
M66	681923	4576417
M67	663347	4559887
M68	668000	4559869
M69	678262	4560685
MC1	692292	4598380
MC2	685351	4608848
MC3	685678	4609216
MC4	694325	4615817
MC5	694423	4615637
MC6	695349	4615459
MC7	695366	4615476
MC8	695328	4615470
MC9	695327	4615482
MC10	695324	4615468
MC11	695016	4615368
MC12	695009	4615471
MC13	701217	4606100
MC14	711000	4601492
MC15	711037	4601569
MC16	710517	4601207
MC17	710572	4601215
MC18	710345	4601068
MC19	710198	4601165
MC20	710410	4601165
MC21	695391	4615457
MC22	710520	4601010
MC23	710503	4601031
MC24	711085	4600892
MC25	663096	4563648
MC26	695224	4615399
MC27	700750	4597422
MC28	677840	4554846
MC29	696087	4614879
MC30	703908	4598320
MC31	685741	4572145
MC32	710668	4600859
MC33	673250	4558800

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	--

MC34	673635	4559276
MC35	675855	4556050
MC36	688474	4565716
MC37	688372	4567280

Tabela 2 – Pontos de amostragem acústica de Quirópteros

Pontos de amostragem	Coordenadas UTM	
Q1A	658615	4560315
Q1B	658813	4561979
Q2A	660642	4563985
Q2B	662285	4563907
Q3A	667606	4562517
Q3B	667603	4560247
Q4A	670811	4561016
Q4B	673852	4561764
Q5A	663959	4569272
Q5B	662210	4567584
Q6A	669063	4567282
Q6B	665823	4569014
Q7A	670895	4567188
Q7B	673822	4566316
Q8A	677421	4569233
Q8B	675585	4567222
Q9A	683202	4564877
Q9B	680285	4565609
Q10A	669471	4573036
Q10B	666170	4570264
Q11A	673459	4574081
Q11B	671033	4571252
Q12A	678007	4572421
Q12B	675491	4573385
Q13A	683150	4571417
Q13B	684138	4574047
Q14A	672639	4576549
Q14B	674052	4579027
Q15A	677536	4576660
Q15B	679493	4579217
Q16A	683418	4577762
Q16B	682110	4578410

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	--

Q17A	676496	4583083
Q17B	675073	4584093
Q18A	683104	4584708
Q18B	682921	4582776
Q19A	688195	4582615
Q19B	686155	4580398
Q20A	683444	4585261
Q20B	682081	4587086
Q21A	686410	4587539
Q21B	686955	4585817
Q22A	692721	4587592
Q22B	691210	4585976
Q23A	686141	4592784
Q23B	687837	4593217
Q24A	692993	4590465
Q24B	692132	4593409
Q25A	697510	4590840
Q25B	696884	4594249
Q27A	691370	4598400
Q27B	691195	4595949
Q31A	693900	4603533
Q31B	691753	4600779
Q32A	698715	4603057
Q32B	698038	4600441
Q34A	686196	4606984
Q34B	689137	4609207
Q36A	699203	4606527
Q36B	697521	4608927
Q37A	702005	4607427
Q37B	703345	4609399
Q45A	673954	4558699
Q45B	671744	4559382
Q46A	675642	4556240
Q46B	677232	4557862
Q47A	683902	4563454
Q47B	682838	4561426
Q48A	688516	4567099
Q48B	687179	4569561
Q49A	711938	4601712
Q49B	710909	4603713
Q50A	688108	4615498


	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	--

Q50B	689435	4617581
Q51A	694611	4615765
Q51B	692893	4617714
Mac 1	666251	4568061
Mac 2	666028	4568378
Mac 3	667058	4569335
Mac 4	671615	4566589
Mac 5	672266	4565023
Mac 6	681114	4572540
Mac 7	681835	4572345
Mac 8	682234	4572435
Mac 9	682565	4571913
Mac 10	682574	4573271
Mac 11	682480	4575991
Mac 12	684651	4576171
Mac 13	685037	4576187
Mac 14	683803	4580228
Mac 15	684280	4580381
Mac 16	682843	4580718
Mac 17	691307	4589244
Mac 18	691686	4589214
Mac 19	693000	4590361
Mac 20	693350	4590649
Mac 21	695814	4592776

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	---

ANEXO IV

CARTOGRAFIA



Legenda

Abrigos de Quirópteros

Classes de nº total de indivíduos/abrigo

Área de Influência
do AHBS

Zona Controlo



0



0



[0, 10]



[0, 10]



[10, 30]



[10, 30]



[30, 100]



[30, 100]



[100, 500]



[100, 500]


Área de Influência do AHBS

Quadrícula 5 x 5Km

Cota 138

Cota 234

Escala 1:25 000



Legenda

Abrigos de Quirópteros

Classes de nº total de indivíduos/abrigo

Área de Influência
do AHBS

Zona Controlo



0



0



]0,10]



]0,10]



]10,30]



]10,30]



]30,100]



]30,100]



]100,500]



]100,500]


— Área de Influência do AHBS

□ Quadricula 5 x 5Km

▨ Cota 138

▨ Cota 234

Escala 1:25 000



Legenda

Abrigos de Quirópteros

Classes de nº total de indivíduos/abrigo

Área de Influência do AHBS	Zona Controlo
0	0
]0,10]	]0,10]
]10,30]	]10,30]
]30,100]	]30,100]
]100,500]	]100,500]


— Área de Influência do AHBS

□ Quadricula 5 x 5Km

Cota 138

Cota 234

Escala 1:25 000



Legenda

Abrigos de Quirópteros

Classes de nº total de indivíduos/abrigo

Área de Influência
do AHBS

Zona Controlo



0



0



]0,10]



]0,10]



]10,30]



]10,30]



]30,100]



]30,100]



]100,500]



]100,500]


— Área de Influência do AHBS

□ Quadricula 5 x 5Km

▨ Cota 138

▨ Cota 234

Escala 1:25 000



Legenda

Abrigos de Quirópteros

Classes de nº total de indivíduos/abrigo

Área de Influência
do AHBS

Zona Controlo



0



0



]0,10]



]0,10]



]10,30]



]10,30]



]30,100]



]30,100]



]100,500]



]100,500]


— Área de Influência do AHBS

□ Quadricula 5 x 5Km

▨ Cota 138

▨ Cota 234

Escala 1:25 000



Legenda

Abrigos de Quirópteros

Classes de nº total de indivíduos/abrigo

Área de Influência
do AHBS

Zona Controlo



0



0



[0, 10]



[0, 10]



[10, 30]



[10, 30]



[30, 100]



[30, 100]



[100, 500]



[100, 500]


— Área de Influência do AHBS

□ Quadricula 5 x 5Km

▨ Cota 138

▨ Cota 234

Escala 1:25 000



Legenda

Abrigos de Quirópteros

Classes de nº total de indivíduos/abrigo

Área de Influência
do AHBS

Zona Controlo



0



0



]0,10]



]0,10]



]10,30]



]10,30]



]30,100]



]30,100]



]100,500]



]100,500]


Área de Influência do AHBS

Quadrícula 5 x 5Km

Cota 138

Cota 234


Escala 1:25 000



Legenda

- Pontos de acústica de Quirópteros na Zona Controlo
- Pontos de acústica de Quirópteros na Área de Influência do AHBS
- Pontos de acústica de Quirópteros - açudes
- Área de Influência do AHBS
- Quadricula 5 x 5Km
- Cota 138
- Cota 234


Escala 1:25 000



Legenda

- Pontos de acústica de Quirópteros na Zona Control
- Pontos de acústica de Quirópteros na Área de Influência do AHBS
- Pontos de acústica de Quirópteros - açudes
- Área de Influência do AHBS
- Quadricula 5 x 5Km
- Cota 138
- Cota 234


Escala 1:25 000



Legenda

- Pontos de acústica de Quirópteros na Zona Controlo
- Pontos de acústica de Quirópteros na Área de Influência do AHBS
- Pontos de acústica de Quirópteros - açudes
- Área de Influência do AHBS
- Quadricula 5 x 5Km
- Cota 138
- Cota 234


Escala 1:25 000



Legenda

-  Pontos de acústica de Quirópteros na Zona de Controlo
-  Pontos de acústica de Quirópteros na Área de Influência do AHBS
-  Pontos de acústica de Quirópteros - açudes
-  Área de Influência do AHBS
-  Quadricula 5 x 5Km
-  Cota 138
-  Cota 234


Escala 1:25 000



Legenda

- Pontos de acústica de Quirópteros na Zona Controllo
- Pontos de acústica de Quirópteros na Área de Influência do AHBS
- Pontos de acústica de Quirópteros - açudes
- Área de Influência do AHBS
- Quadricula 5 x 5Km
- Cota 138
- Cota 234


Escala 1:25 000



Legenda

-  Pontos de acústica de Quirópteros na Zona Controlo
-  Pontos de acústica de Quirópteros na Área de Influência do AHBS
-  Pontos de acústica de Quirópteros - açudes
-  Área de Influência do AHBS
-  Quadricula 5 x 5Km
-  Cota 138
-  Cota 234


Escala 1:25 000



Legenda

- Pontos de acústica de Quirópteros na Zona Controlo
- Pontos de acústica de Quirópteros na Área de Influência do AHBS
- Pontos de acústica de Quirópteros - açudes
- Área de Influência do AHBS
- Quadricula 5 x 5Km
- Cota 138
- Cota 234


Escala 1:25 000



Legenda

- Pontos de acústica de Quirópteros na Zona Controlada
- Pontos de acústica de Quirópteros na Área de Influência do AHBS
- Pontos de acústica de Quirópteros - açudes
- Área de Influência do AHBS
- Quadrícula 5 x 5Km
- Cota 138
- Cota 234


Escala 1:25 000



Legenda

-  Pontos de acústica de Quirópteros na Zona Controlada
-  Pontos de acústica de Quirópteros na Área de Influência do AHBS
-  Pontos de acústica de Quirópteros - açudes
-  Área de Influência do AHBS
-  Quadricula 5 x 5Km
-  Cota 138
-  Cota 234

Escala 1:25 000



Legenda

-  Pontos de acústica de Quirópteros na Zona Controllo
-  Pontos de acústica de Quirópteros na Área de Influência do AHBS
-  Pontos de acústica de Quirópteros - açudes
-  Área de Influência do AHBS
-  Quadricula 5 x 5Km
-  Cota 138
-  Cota 234

Escala 1:25 000

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

ANEXO V

RESUMO TÉCNICO

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	--

O presente documento constitui o Resumo Técnico (RT) do Relatório de Monitorização de Fauna – Quirópteros da Campanha de Outono de 2011.

Objectivos

Este Programa de Monitorização tem como objectivos:

- Determinação de impactos / alterações através do acompanhamento das populações ao longo das diferentes etapas do empreendimento, quer das prospectadas no âmbito do estudo do RECAPE, quer das identificadas nos novos levantamentos;
- A avaliação da eficácia das medidas de minimização e compensatórias a implementar, na conservação das populações de quirópteros da área.

Âmbito

O âmbito deste estudo teve como base a campanha de monitorização, realizada no Outono de 2011 do descritor Fauna – Quirópteros, para a Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS).

Tabela 1 – Datas da realização das amostragens e esforço de amostragem

CAMPANHA	DATAS DE REALIZAÇÃO DE AMOSTRAGENS	ESFORÇO DE AMOSTRAGEM
Outono de 2011 Abrigos (Fase de Obra)	De 18 a 22 e 27 a 30 de Setembro	2 pessoas/equipa (2 equipas)
	15 de Outubro	2 pessoas/equipa (2 equipas)
Outono de 2011 Acústica (Fase de Obra)	De 5 a 8, 16 a 22 e 27 a 30 de Setembro	2 pessoas/equipa (2 equipas)
	De 12 a 21 e de 25 a 28 de Outubro	2 pessoas/equipa (2 equipas)

Parâmetros a registar

Durante campanhas às quais o presente relatório anual se refere pretendeu-se efectuar as seguintes acções:

- i) o inventário de espécies de morcegos;
- ii) o inventário de abrigos;
- iii) a localização dos habitats de alimentação;
- iv) caracterização das variáveis ambientais (tipo de biótopo) que determinam a presença das diversas espécies de morcegos e identificam a importância do biótopo (alimentação).

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	---	--

Metodologia

Monitorização de abrigos

A monitorização de abrigos foi realizada durante o período diurno recorrendo a focos e frontais de luz branca e fria, com a possibilidade de serem substituídos por luz vermelha (de forma a diminuir a perturbação sobre os animais). A deslocação ao longo dos abrigos é efectuada lentamente de modo a permitir a procura de animais nas paredes, tecto e cavidades dos abrigos. Sempre que detectados animais procede-se à sua identificação, contagem e se possível registo fotográfico.

Em cada abrigo é também prospectada a presença de vestígios (guano, cadáveres, etc).

O tratamento estatístico consistiu na aplicação do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido de um post-hoc de Dunns, para comparar os dados relativos às 4 épocas de Outono de 2008, 2009, 2010 e 2011 e para a comparação da ocupação de abrigos em função da sua localização espacial.

Deteção acústica de ultra-sons

Esta metodologia permite detectar actividade e identificar as espécies de morcegos presentes na área de estudo. Importa, no entanto, realçar que esta metodologia não permite uma contabilização do número exacto de indivíduos presentes. O equipamento utilizado (Petterson® 240x) encontra-se equipado com 2 sistemas de detecção: o heterodino e o tempo expandido, tendo sido utilizado o segundo sistema, que permite o registo dos contactos detectados e posterior análise dos registos sonoros dos morcegos com recurso ao programa de análise de sons BatSound Pro (Pettersson Elektronik AB®). A metodologia a adoptar consistiu na amostragem por pontos durante um período de 10 minutos. Os censos foram iniciados meia hora após o pôr-do-sol e terminados 2/3 horas depois (Rainho et al. 1998).

Relativamente ao tratamento estatístico dos dados de detecção acústica, optou-se pelo teste de Chi-Quadrado para efectuar uma comparação entre a ocorrência da espécie / complexo entre épocas homólogas (Outono 2009, 2010 e 2011). A análise estatística, foi realizada considerando conjuntos de dados das 4 espécies / complexos de espécies consideradas como localmente mais comuns: *Eptesicus serotinus* / *Eptesicus isabellinus*, *Tadarida teniotis*, *Pipistrellus kuhli* e *Pipistrellus pipistrellus* / *Pipistrellus pygmaeus* / *Miniopterus schreibersii*.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

Síntese dos resultados obtidos

Monitorização de abrigos

Através da prospecção e inspecção de abrigos foi possível identificar a presença de 7 a 9 espécies/complexos de espécies em 19 abrigos na Área de Influência do AHBS e 6 a 12 espécies/complexos de espécies em 17 abrigos na Área Controlo.

A percentagem de ocupação de abrigos referenciados na Área de Influência do AHBS foi de 44% (19 ocupados em 43 abrigos potenciais prospectados). A percentagem de ocupação de abrigos referenciados para a Área Controlo foi de 46% (17 ocupados em 37 abrigos potenciais).

Relativamente ao M40 – Abrigo Construído (Escalão Montante), nesta campanha foram observados dois indivíduos do género *Rhinolophus*.

Relativamente às medidas propostas em relatórios anteriores, nomeadamente da restrição da actividade de obra em torno do abrigo M40, a inspecção no local permitiu verificar que as recomendações têm vindo a ser cumpridas. No entanto, estas medidas não têm tido uma tradução em termos de incremento do número de indivíduos registado na nova galeria. Contudo, tal facto poderá ser uma consequência do curto espaço de tempo que passou desde o final das obras de construção deste abrigo (completaram-se poucos ciclos anuais) bem como às condições microclimáticas não serem as ideais dentro do abrigo. Assim, as medidas deverão continuar a ser aplicadas de modo a que, com o decorrer do tempo, se verifique uma colonização gradual do espaço.

Monitorização por detecção acústica de ultrassons

Durante a campanha de Outono de 2011, através da metodologia de detecção acústica de ultrassons foi possível identificar a presença de um mínimo de 14 espécies, podendo no entanto este número ser de 24 espécies, se considerarmos a possibilidade de algumas vocalizações gravadas pertencerem a indivíduos de espécies mais raras ou indivíduos pertencentes a grupos de espécies cuja distinção de vocalizações é impossível através deste método.

No total dos 50 pontos amostrados mensalmente na Área de Influência do AHBS, foi detectada actividade de quirópteros em 48, durante o decurso da campanha trimestral. No total dos 26 pontos amostrados mensalmente na Área Controlo, foi detectada actividade de quirópteros em 23 deles. Quanto aos açudes, no total dos 21 pontos amostrados mensalmente, foi detectada actividade de quirópteros em 20 deles, durante a campanha de Outono de 2011.

	AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA QUIRÓPTEROS CAMPANHA DE OUTONO DE 2011	 AHBS/RMQ.13.01
---	--	--

Os resultados da análise estatística realizada para comparação da ocorrência de espécies entre as épocas de Outono de 2009, 2010 e 2011 revelaram não existir diferenças significativas para o complexo de espécies *E.serotinus/isabellinus*. Para o complexo *P.pipistrellus* / *P.pygmaeus* / *M.schreibersii* e para as espécies *P. kuhli* e *T. teniotis* verificou-se um aumento no número de ocorrências entre épocas homólogas, sendo esta diferença estatisticamente significativa.

Proposta de novas medidas de mitigação e ou de alteração ou desactivação de medidas já adoptadas

Tendo já sido efectuada a transferência de quirópteros para o novo abrigo e a selagem dos antigos abrigos nas galerias de exploração do escalão de montante de seguida, sugere-se que se continuem a implementar as medidas já propostas anteriormente, com vista a minimizar eventuais impactes decorrentes das obras na proximidade do Novo Abrigo:

1. Implementar uma área de restrição ao uso de explosivos em torno do novo abrigo;
2. Implementar uma área de proibição de circulação de máquinas e veículos em torno do novo abrigo, sendo que para isso não se devem utilizar áreas foras das previstas em projecto.