

ANEXO 1: LISTAGEM DE ESPÉCIES BENTÓNICAS OBTIDAS POR PONTO DE AMOSTRAGEM

	Estação (ind/m ²)									
	T11	T12	T13	T14	T15	T21	T22	T23	T24	T25
Filo Annelida										
Classe Polychaeta										
Ordem não atribuída										
Família Capitellidae										
<i>Mediomastus fragilis</i> Rasmussen, 1973	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Ordem Phyllodocida										
Família Glyceridae										
<i>Glycera tridactyla</i> Schmarda, 1861	0	4	0	0	8	0	0	0	0	0
Família Nephtyidae										
<i>Nephtys assimilis</i> Örsted, 1843	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
<i>Nephtys cirrosa</i> Ehlers, 1868	14	30	14	0	4	0	4	0	0	0
<i>Nephtys hombergii</i> Savigny in Lamarck, 1818	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Ordem Sabellida										
Família Oweniidae										
<i>Owenia fusiformis</i> Delle Chiaje, 1844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordem Spionida										
Família Magelonidae										
<i>Magelona johnstoni</i> Fiege, Licher & Mackie, 2000	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0
Família Spionidae										
<i>Scolelepis (Scolelepis) squamata</i> (O.F. Muller, 1806)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordem não atribuída										
Família Opheliidae										
<i>Ophelia neglecta</i> Schneider, 1892	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0
Ordem Terebellida										
Família Pectinariidae										
<i>Lagis koreni</i> Malmgren, 1866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filo Mollusca										
Classe Bivalvia										
Ordem Veneroidea										
Família Donacidae										
<i>Donax vittatus</i> (da Costa, 1778)	0	8	4	0	8	4	0	0	0	0
Ordem Cardiida										
Família Tellinidae										
<i>Fabulina fabula</i> Gmelin, 1791	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordem Adapedonta										
Família Pharidae										
<i>Pharus legumen</i> (Linnaeus, 1758)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordem Littorinimorpha										
Família Naticidae										
<i>Euspira nitida</i> (Donovan, 1804)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filo Arthropoda										
Classe Malacostraca										
Ordem Mysida										

	Estação (ind/m ²)									
	T11	T12	T13	T14	T15	T21	T22	T23	T24	T25
Família Mysidae										
<i>Gastrosaccus spinifer</i> (Goës, 1864)	0	0	14	8	0	0	14	0	0	0
Ordem Cumacea										
Família Bodotriidae										
<i>Eocuma dollfusi</i> Calman, 1907	8	18	0	0	10	0	0	0	0	0
<i>Bodotria scorpioides</i> (Montagu, 1804)	4	24	0	0	10	0	0	0	0	0
Família Diastylidae										
<i>Diastylis bradyi</i> Norman, 1879	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordem Amphipoda										
Família Atylidae										
<i>Nototropis swammerdami</i> (Milne-Edwards, 1830)	4	14	0	0	0	0	0	0	0	4
<i>Nototropis falcatus</i> (Metzger, 1871)	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Bathyporeiidae										
<i>Bathyporeia elegans</i> Watkin, 1938	0	16	0	0	10	0	0	0	0	0
<i>Bathyporeia pilosa</i> Lindström, 1855	8	24	0	0	24	0	0	0	0	0
Família Oedicerotidae										
<i>Pontocrates arenarius</i> (Bate, 1858)	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordem Decapoda										
Família Diogenidae										
<i>Diogenes pugilator</i> (Roux, 1829)	44	8	0	0	54	0	0	0	0	0
Família Portunidae										
<i>Portumnus latipes</i> (Pennant, 1777)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordem Isopoda										
Família Cirolanidae										
<i>Eurydice naylori</i> Jones & Pierpoint, 1997	4	4	0	0	0	0	0	0	4	0
Família Idoteidae										
<i>Idotea emarginata</i> (Fabricius, 1793)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Filo Echinodermata										
Classe Ophiuridoidea										
Ordem Ophiurida										
Família Amphiuroidae										
<i>Amphipholis squamata</i> (Delle Chiaje, 1828)	8	4	0	0	8	0	0	0	0	0

	Estação (ind/m ²)				
	T51	T52	T53	T54	T55
Filo Annelida					
Classe Polychaeta					
Ordem não atribuída					
Família Capitellidae					
<i>Mediomastus fragilis</i> Rasmussen, 1973	20	0	0	0	0
Ordem Phyllodocida					
Família Glyceridae					
<i>Glycera tridactyla</i> Schmarida, 1861	18	10	4	0	0
Família Nephtyidae					
<i>Nephtys assimilis</i> Örsted, 1843	0	0	0	0	0
<i>Nephtys cirrosa</i> Ehlers, 1868	14	4	4	0	0
<i>Nephtys hombergii</i> Savigny in Lamarck, 1818	0	0	0	0	0
Ordem Sabellida					
Família Oweniidae					
<i>Owenia fusiformis</i> Delle Chiaje, 1844	0	0	0	0	0
Ordem Spionida					
Família Magelonidae					
<i>Magelona johnstoni</i> Fiege, Licher & Mackie, 2000	4	4	0	0	0
Família Spionidae					
<i>Scolelepis (Scolelepis) squamata</i> (O.F. Muller, 1806)	4	0	0	0	0
Ordem não atribuída					
Família Ophellidae					
<i>Ophelia neglecta</i> Schneider, 1892	0	0	0	0	0
Ordem Terebellida					
Família Pectinariidae					
<i>Lagis koreni</i> Malmgren, 1866	10	0	0	0	0
Filo Mollusca					
Classe Bivalvia					
Ordem Veneroida					
Família Donacidae					
<i>Donax vittatus</i> (da Costa, 1778)	0	0	4	4	0
Ordem Cardiida					
Família Tellinidae					
<i>Fabulina fabula</i> Gmelin, 1791	0	0	0	0	0
Ordem Adapedonta					
Família Pharidae					
<i>Pharus legumen</i> (Linnaeus, 1758)	0	0	0	0	0
Ordem Littorinimorpha					
Família Naticidae					
<i>Euspira nitida</i> (Donovan, 1804)	8	0	0	0	0
Filo Arthropoda					
Classe Malacostraca					
Ordem Mysida					
Família Mysidae					

	Estação (ind/m ²)				
	T51	T52	T53	T54	T55
<i>Gastrosaccus spinifer</i> (Goês, 1864)	0	0	0	0	0
Ordem Cumacea					
Família Bodotriidae					
<i>Eocuma dollfusi</i> Calman, 1907	10	8	4	0	0
<i>Bodotria scorpioides</i> (Montagu, 1804)	18	20	98	0	0
Família Diastylidae					
<i>Diastylis bradyi</i> Norman, 1879	0	0	0	0	0
Ordem Amphipoda					
Família Atylidae					
<i>Nototropis swammerdami</i> (Milne-Edwards, 1830)	0	4	4	0	0
<i>Nototropis falcatus</i> (Metzger, 1871)	0	0	0	0	0
Família Bathyporeiidae					
<i>Bathyporeia elegans</i> Watkin, 1938	0	0	0	0	0
<i>Bathyporeia pilosa</i> Lindström, 1855	0	0	8	0	0
Família Oedicerotidae					
<i>Pontocrates arenarius</i> (Bate, 1858)	0	0	0	0	0
Ordem Decapoda					
Família Diogenidae					
<i>Diogenes pugilator</i> (Roux, 1829)	14	0	8	0	0
Família Portunidae					
<i>Portumnus latipes</i> (Pennant, 1777)	0	0	0	0	0
Ordem Isopoda					
Família Cirolanidae					
<i>Eurydice naylori</i> Jones & Pierpoint, 1997	0	4	0	0	0
Família Idoteidae					
<i>Idotea emarginata</i> (Fabricius, 1793)	0	0	0	0	0
Filo Echinodermata					
Classe Ophiuroidea					
Ordem Ophiurida					
Família Amphiuridae					
<i>Amphipholis squamata</i> (Delle Chiaje, 1828)	4	0	10	0	0